

الامتياز

فى

الرياضيات



الصف

الثانى

الاعدادى

2019

إعداد

أ. عبدالمقصود حنفى

الثانى
الترم

أول التحليل

(٢) تحليل المقدار الثلاثي

الثلاثي البسيط في الصورة $س^٢ + ب س + ح$

معامل $س^٢ = ١$

(٢) حل كلاما يأتي

$$[١] س^٢ + ٣س + ٢ = (س + ٢)(س + ١)$$

$$[٢] س^٢ - ١٠س + ٢٤ =$$

$$= (س - ٤)(س - ٦)$$

$$[٤] م (٧ + م) - ١٨ = م^٢ + ٧م - ١٨$$

$$= (م + ٩)(م - ٢)$$

$$[٥] س^٣ - ٥س^٢ + ٤س =$$

$$= س (س^٢ - ٥س + ٤)$$

$$= س (س - ١)(س - ٤)$$

$$[٦] س^٣ - ٣٠س^٢ + ٦٣س =$$

$$= ٣س (س^٢ - ١٠س + ٢١)$$

$$= ٣س (س - ٣)(س - ٧)$$

$$[٧] س^٢ - ١٣س + ٣٦ =$$

$$= (س - ٤)(س - ٩)$$

$$[٨] ٨س - ٩س^٢ =$$

$$= -س^٢ (٨ + ٩س)$$

$$= -س^٢ (٨ + ٩س)$$

$$= -س (١ - س)(٩ + س)$$

(١) التحليل بإخراج ٢٢

(١) حل كلاما يأتي

$$[١] ٨س^٢ + ١٢س =$$

$$= ٤س (٢س + ٣)$$

$$[٢] ١٠س ص - ٨س ع =$$

$$= ٢س (٥ص - ٤ع)$$

$$[٣] ٤س^٢ ص + ٨س^٢ ص - ٢س^٢ ص =$$

$$= ٢س^٢ ص (٢ + ٤ - ١)$$

$$[٤] ٢س - ١٢ = ٢(س - ٦)$$

$$[٥] ٥س - ٢٠ = ٥(س - ٤)$$

$$[٦] ٢س + ٤ =$$

$$= ٢(س + ٢)$$

$$[٧] ٣س + ٥س =$$

$$= س (٥ + ٣س)$$

$$[٨] ٣س^٢ - ٥س^٢ + ٣س =$$

$$= س (٣س - ٥س + ٣)$$

$$[٩] ٨س^٢ ب - ١٢س ب =$$

$$= ٤س ب (٢س - ٣)$$

تمارين (١)

س حل كلا مما يأتي تحليلًا تامًا

- ١ س ٢ + ٣ س - ٢٧
- ٢ س ٢ - ٦ س - ١٦
- ٣ س ٢ - ٢ س - ٨
- ٤ س ٢ - ٥ س + ١٤
- ٥ س ٢ - ١١ س + ٢٤
- ٦ س ٢ - ٢٥ س + ٢٤
- ٧ س ٢ - ٥ س - ٢٤
- ٨ س ٢ - ٢٣ س - ٢٤
- ٩ س ٢ + س - ١٢
- ١٠ س ٢ + ١١ س - ١٢
- ١٢ س ٢ - ١٣ س - ٣٠
- ١١ س ٢ + ٢ س - ٣٥
- ١٣ س ٣ - ١٢ س ٢ + ٣٥ س
- ١٤ س ٦ - ٦ س ٣ + ٨
- ١٥ س (٧ + س) + ١٠
- ١٦ س ٦ + ٣ س ٣ - ٥٤

- ١ س ٢ - ٥ س + ٦
- ٢ س ٢ - ٧ س + ١٢
- ٣ س ٢ - ٩ س + ٢٠
- ٤ س ٢ - ٨ س + ١٥
- ٥ س ٢ - ٨ س + ١٢
- ٦ س ٢ - ٧ س + ١٠
- ٧ س ٢ - ٢ س - ١٥
- ٨ س ٢ - ١٠ س + ٢٤
- ٩ س ٢ - ١٤ س + ٢٤
- ١٠ س ٢ - ١٠ س - ٢٤
- ١١ س ٢ - ٢ س - ٢٤
- ١٢ س ٢ + س - ٢٠
- ١٣ س ٢ + ٤ س - ١٢
- ١٤ س ٢ - ١١ س + ٣٠
- ١٥ س ٢ - ٧ س - ٣٠
- ١٦ س ٣ - ٨ س ٢ + ١٥ س
- ١٧ س ٤ - ١٠ س ٢ + ١٦
- ١٨ س ١ - ٩ س ٠ + ٢٠
- ١٩ س ١ - س ٤ - ٣٠
- ٢٠ س ٤ - س ٢ - ٤٢
- ٢١ س ٢ - س - ١٢
- ٢٢ س ٢ - ٣ س - ١٠
- ٢٣ س ٢ - س - ٢٠

س أوجد قيمة ك الصحيحة الموجبة التي تجعل المقدار قابلًا للتحليل

- ١ س ٢ - ٩ س + ك
- ٢ س ٢ - ك س - ٢
- ٣ س ٢ + ٥ س + ك
- ٤ س ٢ + ك س - ٣٠

تمارين (٢)

س١: حل كلاً من المقادير الآتية

- ١ $١٥ + ٢س٢ - ٣س١$
- ٢ $٦ + ٢س٥ - ١٩س١$
- ٣ $١٠ + ٢س٣ - ٧س١$
- ٤ $٨ + ٢س٥ - ١٤س١$
- ٥ $١٠ + ٢س٢ - ١٣س١$
- ٦ $١٥ - ٢س٢ + ٧س١$
- ٧ $٦ - ٢س٥ - ٧س١$
- ٨ $٣ - ٢س٥ - ٢س١$
- ٩ $٢١ - ٢س٢ + ١س١$
- ١٠ $٦ - ٢س١ - ٥س١$
- ١١ $٢٠ + ٢س٦ - ٢٣س١$
- ١٢ $٨ + ٢س٥ - ٢٢س١$
- ١٣ $١٠ + ٢س٣ - ١س١$
- ١٤ $٨ + ٢س٥ - ٢٢س١$
- ١٥ $١٠ + ٢س١٢ - ٢٣س١$
- ١٦ $٨ - ٢س٣ + ١٠س١$
- ١٧ $٨ - ٢س٣ - ١٠س١$
- ١٨ $١٠ - ٢س٣ - ١س١$
- ١٩ $٣٢ - ٢س٣ + ٤س١$
- ٢٠ $٤ - ٢س٥ + ٧س١$

تحليل المقدار الثلاثي غير البسيط معامل س^٢ ≠ ١

$$\begin{array}{cc} ٢س & - \\ ٣ & - \\ ٥ & - \end{array}$$

$$١ \quad ١٥ + ٢س٢ - ٣س١$$

$$(٥ - س)(٣ - ٢س) =$$

$$\begin{array}{cc} ١٥ & - \\ ٣ & - \\ ٢ & - \end{array}$$

$$٢ \quad ٦ + ١٩س١ - ١٥س٢$$

$$(٢ - ١٥س)(٣ - ١٩س) =$$

$$\begin{array}{cc} ١٥ & - \\ ٩ & - \\ ٣ & + \end{array}$$

$$٣ \quad ٢٧ - ١٦س١ + ١٥س٢$$

$$(٣ + ١٥س)(٩ - ١٦س) =$$

$$\begin{array}{cc} ٢س & + \\ ٧ & - \\ ٣ & - \end{array}$$

$$٤ \quad ٢١ - ٢س٢ + ١س١$$

$$(٣ - ٢س)(٧ + ١س) =$$

$$\begin{array}{cc} ١٥ & - \\ ٣ & - \\ ٢ & - \end{array}$$

$$٥ \quad ٦ + ١٩س١ - ١٥س٢$$

$$(٢ - ١٥س)(٣ - ١٩س) =$$

$$\begin{array}{cc} ٥س & - \\ ٧ & - \\ ٢ & - \end{array}$$

$$٦ \quad ٢٨ + ١٠س٢ - ٤س٣$$

$$٢(١٤ + ٥س٢ - ١٧س٣) =$$

$$٢(٥س - ٧)(٢ - ١٧س) =$$

المقدار الثلاثي المربع الكامل

شروطه

- 1 الحد الأول مربعاً كاملاً
- 2 الحد الأخير مربعاً كاملاً
- 3 الحد الأوسط = $\pm 2 \times \sqrt{\text{الحد الأول}} \times \sqrt{\text{الحد الأخير}}$

مثال ١ اي مما ياتي مربع كامل

- 1 $س^2 + 6س + 9$ ← مربع كامل
- 2 $س^2 - 8س + 16$ ← ليس مربع كامل
- 3 $س^2 + 5س + 25$ ← ليس مربع كامل
- 4 $س^2 - 20س + 4$ ← مربع كامل

إذا كان المقدار مربعاً كاملاً فإن :-

$$\frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}} = \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}}$$

$$\text{الحد الأوسط} = \pm 2 \times \sqrt{\text{الحد الأول}} \times \sqrt{\text{الحد الأخير}}$$

مثال ٢ أوجد قيمة ك التي تجعل المقدار مربع كامل

$$١ \quad ٢٢ - ٢٠ك + ك^2$$

الحل

$$\therefore \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}} =$$

$$١ = \frac{٢٢ \times ٢٢}{٢٢ \times ٤}$$

$$٢ \quad ك س^2 + ٢٠س + ٢٥$$

الحل

$$\therefore \frac{(\text{الحد الأوسط})^2}{\text{الحد الأول} \times \text{الحد الأخير}} =$$

$$\frac{(٢٠س)^2}{٢٥ \times ٤} = \frac{(٢٠س)^2}{١٠٠} \therefore ك = ٤$$

$$٣ \quad ١٦ص^2 + كص + ١٠٠$$

الحل

$$\text{الحد الأوسط} = \pm 2 \times \sqrt{\text{الحد الأول}} \times \sqrt{\text{الحد الأخير}}$$

$$٨٠ \pm = ١٠ \times ٤ \times ٢ \pm =$$

مثال ٣ حل كلاً مما يلي تحليل كاملاً

- 1 $س^2 + ١٠س + ٢٥$ ص
- 2 $س^2 - ٢٠س + ٤$ ص
- 3 $س^2 - ٨س + ١٦$ ص

مثال ٤

أستخدم التحليل في تبسيط إيجاد قيمة ك لامن المقادير الاتية

$$١ \quad (٧٣)^2 - ٢ \times ٧٣ \times ٦٣ + (٦٣)^2$$

الحل

$$٢ \quad (١٠)^2 = (٦٣ - ٧٣)^2 =$$

$$١٠٠ =$$

تمارين (٣)

س١ : بين أى المقادير الآتية مربعاً كاملاً

$$\begin{aligned} [٢] \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ \\ [٤] \quad & ٤٩ + ٢٢ - ٢٢ \\ [٦] \quad & ٤٩ - ٢٢ + ٢٢ \\ [٨] \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} [١] \quad & ٩ + ٢٢ \\ [٣] \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ \\ [٥] \quad & ٢٢ + ٢٢ + ٢٢ \\ [٧] \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٢٢ \end{aligned}$$

س٢ : حل كلاً مما يلي تحليلًا كاملاً:

$$\begin{aligned} 2 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ١ \\ 4 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ١٦ \\ 6 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ١ \\ 8 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٩ \\ 10 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ١ \\ 12 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ٢٥ \\ 14 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ١٦ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ١٠ \\ 3 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ٣٦ \\ 5 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ١٤ \\ 7 \quad & ٢٢ + ٢٢ + ١٠ \\ 9 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ١ \\ 11 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٣٠ \\ 13 \quad & ٢٢ - ٢٢ + ٩ \end{aligned}$$

س٣ : أكمل كلا من المقادير الآتية حتى تكون مربع كامل

$$\begin{aligned} 6 \quad & ٢٥ + ٢٢ + ٣٠ + \dots \\ 7 \quad & ٤٩ + \dots + ١ \\ 8 \quad & ١٠ - \dots + ١ \\ 9 \quad & ٢٥ - ٢٢ + ١٠ + \dots \\ 10 \quad & ٣٦ - ٢٢ + \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & ٩ + ٢٢ + \dots + ١٦ \\ 2 \quad & ٢٠ + \dots + ٤ \\ 3 \quad & ٦ + \dots + ١ \\ 4 \quad & ٩ + \dots + ١٦ \\ 5 \quad & ٢٥ + \dots - ١ \end{aligned}$$

س٤ : أوجد قيمة ك الموجبة التى تجعل كل مقدار ثلاثى مربعاً كاملاً :-

$$\begin{aligned} 6 \quad & ٩ - ٢٢ + ك \\ 7 \quad & ٤ + ٢٢ + ك \\ 8 \quad & ٩ + ٢٢ - ٢٢ + ك \\ 9 \quad & ٤ + ٢٢ + ١٢ + ك \\ 10 \quad & ١٦ + ٢٢ + ك + ١٠٠ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \quad & ٣٦ + ٢٢ + ك + ١ \\ 2 \quad & ٢٥ + ٢٢ + ٤٠ + ك \\ 3 \quad & ٢٥ + ٢٢ + ٢٠ + ك \\ 4 \quad & ٩ + ٢٢ - ٣٠ + ك \\ 5 \quad & ٤٩ + ٢٢ - ٢٢ + ك + ٩ \end{aligned}$$

تحليل الفرق بين مربعين

مثال ٢

استخدم تحليل الفرق بين مربعين لتسهيل إيجاد قيمة :-

$$١ \quad (٦,٤) - (٣,٦)$$

$$(٣,٦ + ٦,٤) (٣,٦ - ٦,٤) =$$

$$٢٨ = ١٠ \times ٢,٨$$

$$٢ \quad (٣٣) - (٢٣)$$

$$(٢٣ + ٣٣) (٢٣ - ٣٣) =$$

$$٥٦٠ = ٥٦ \times ١٠$$

مثال ٣

١ إذا كان $٣ = ص - ص$ ، $٥ = ص + ص$ ،
أوجد قيمة $ص^٢ - ص^٢$

(الحل :-)

$$ص^٢ - ص^٢ = (ص - ص) (ص + ص)$$

$$١٥ = ٥ \times ٣ =$$

٢ إذا كان $٣٥ = ب - ب$ ، $٧ = ب + ب$ ،

أوجد قيمة $ب - ب$

(الحل :-)

$$٣٥ = ب - ب$$

$$٣٥ = (ب + ب) (ب - ب) \therefore$$

$$٣٥ = ٧ \times (ب - ب)$$

$$٥ = \frac{٣٥}{٧} = ب - ب$$

٢ ب - ب يسمى مقدار فرق بين مربعين

لتحليل الفرق بين مربعين

$$= \text{قوسين متشابهين مع الاختلاف في الإشارة فقط}$$

$$= (\sqrt{\text{الأول}} - \sqrt{\text{الثاني}}) (\sqrt{\text{الأول}} + \sqrt{\text{الثاني}})$$

$$\therefore ب^٢ - ب^٢ = (ب + ب) (ب - ب)$$

مثال ١

حل كلا ممايتى تحليلًا تامًا

$$١ \quad ٩س - ١ = (١ - ٣س) (١ + ٣س)$$

$$٢ \quad ٩ب - ب = (ب - ٣ب) (ب + ٣ب)$$

$$٣ \quad ١٠٠ - ١٠س = (١٠ - س) (١٠ + س)$$

$$٤ \quad ٣س - ١٢ = (٣س - ٤) (٣س + ٤)$$

$$٣ = (٢ - س) (٢ + س)$$

$$٥ \quad ٩س - ٩ = (٩س - ٩) (٩س + ٩)$$

$$= س (٣ - س) (٣ + س)$$

$$٦ \quad ١٦ - ٤س = (٤ - ٢س) (٤ + ٢س)$$

$$= (٢ - س) (٢ + س) (٤ + ٢س)$$

$$٧ \quad (١ + س) - ٩ =$$

$$[٣ + (١ + س)] [٣ - (١ + س)]$$

$$= (٤ + س) (٢ - س)$$

تمارين (٤)

س٣ : إذا كانت $s - v = 5$
، $s + v = 8$

فأوجد قيمة $s^2 - v^2$

س٤ : إذا كانت $s^2 - v^2 = 45$
، $s + v = 9$

أوجد قيمة $s - v$

س٥ : إذا كان $a - b = 4$ ، $a + b - 7 = 0$

أوجد $a^2 - b^2$

س٦ : إذا كانت $s - v = 4$

، $s^2 - v^2 = 28$

أوجد $s + v$

س١ : حل كلا مما يلي تحليلًا كاملاً :-

- | | |
|---------|----|
| س١ - ٢ | 1 |
| س٢ - ٢ | 2 |
| س٣ - ٤ | 3 |
| س٤ - ٤ | 4 |
| س٥ - ٢ | 5 |
| س٦ - ٢ | 6 |
| س٧ - ٢ | 7 |
| س٨ - ٢ | 8 |
| س٩ - ٢ | 9 |
| س١٠ - ٢ | 10 |
| س١١ - ٢ | 11 |
| س١٢ - ٢ | 12 |
| س١٣ - ٢ | 13 |
| س١٤ - ٢ | 14 |
| س١٥ - ٢ | 15 |
| س١٦ - ٢ | 16 |
| س١٧ - ٢ | 17 |
| س١٨ - ٢ | 18 |
| س١٩ - ٢ | 19 |
| س٢٠ - ٢ | 20 |
| س٢١ - ٢ | 21 |
| س٢٢ - ٢ | 22 |
| س٢٣ - ٢ | 23 |

س٢ : باستخدام التحليل أوجد قيمة كلا من المقادير الآتية

- | | |
|--------------------|----|
| ١ - ٢ (٩٩٩) | 1 |
| ١٦ - ٢ (٩٦) | 2 |
| ٢ (٢٣) - ٢ (٧٧) | 3 |
| ٢ (١,٦) - ٢ (١١,٦) | 4 |
| ١٩ × ٢١ | 5 |
| ٩ - ٢ (٩٧) | 6 |
| ٢ (٣٥) - ٢ (٦٥) | 7 |
| ٢ (٤٥) - ٢ (٥٥) | 8 |
| ٢٥ - ٢ (٩٥) | 9 |
| ٩٨ × ١٠٢ | 10 |

تمارين (٥)

س١ : حل كلاً مما يأتي :-

- ① س٣ + ١
- ② م٢ + ب٣
- ③ ٢٧ س٢ - ٣٤٣
- ④ ٨ س٢ - ٢٧ ص٣
- ⑤ ٨ - ص٢
- ⑥ ل٢ - ١
- ⑦ م٢ - ٠,٠٠١
- ⑧ ٧ س٢ + ٥٦ ص٢
- ⑨ ١ - س٢
- ⑩ ١٢٥ م٢ - ١

س٢ : اختصر لأبسط صورة :

- ① (٤ + س٢ + ٢ س) (٢ - س) - (٨ + س٢)
- ② (١ - س) (١ + س + س٢) - س٢

س٣ :-

- ① إذا كان س - ص = ٢ ،
س٢ + س ص + ص٢ = ٩ ،

أوجد س٢ - ص٢

- ② إذا كان س٢ - ص٢ = ٥٤ ،

س - ص = ٦ أوجد س٢ + س ص + ص٢

تحليل مجموعي مكعبين والفرق بينهما

$$١ \text{ س}^٣ - \text{ص}^٣ =$$

$$(\text{س} - \text{ص}) (\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢)$$

$$٢ \text{ س}^٣ + \text{ص}^٣ =$$

$$= (\text{س} + \text{ص}) (\text{س}^٢ - \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢)$$

مثال ١ : حل كلاً مما يلي تحليلًا كاملاً :-

$$١ \text{ س}^٣ + ٨ = (\text{س} + ٢) (\text{س}^٢ - ٢ \text{س} + ٤)$$

$$٢ \text{ س}^٣ - ١٢٥ = (\text{س} - ٥) (\text{س}^٢ + ٥ \text{س} + ٢٥)$$

$$٣ \text{ س}^٣ - ٢٧ = (\text{س} - ٣) (\text{س}^٢ + ٣ \text{س} + ٩)$$

$$٤ \text{ س}^٣ + ١٢٥ = (\text{س} + ٥) (\text{س}^٢ - ٥ \text{س} + ٢٥)$$

$$٢٥ \text{ س}^٣ + ٢٥٠ = ٢ (\text{س}^٢ + ١٢٥)$$

$$٢ = (\text{س} + ٥) (\text{س}^٢ - ٥ \text{س} + ٢٥)$$

$$٦ \text{ س}^٤ - ٢٧ \text{ س} = \text{س} (\text{س}^٣ - ٢٧)$$

$$= \text{س} (\text{س} - ٣) (\text{س}^٢ + ٣ \text{س} + ٩)$$

مثال ٢ إذا كان س - ص = ٣

$$\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢ = ٧ \text{ أوجد س}^٣ - \text{ص}^٣$$

الحل :-

$$= (\text{س} - \text{ص}) (\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢)$$

$$٢١ = ٧ \times ٣ =$$

مثال ٣

$$\text{إذا كان س}^٣ - \text{ص}^٣ = ٣٠ ، \text{س} - \text{ص} = ٥$$

$$\text{أوجد س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢$$

الحل :-

$$\text{س}^٣ - \text{ص}^٣ = ٣٠$$

$$= (\text{س} - \text{ص}) (\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢)$$

$$٣٠ = ٥ (\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢)$$

$$\text{س}^٢ + \text{س} \text{ص} + \text{ص}^٢ = \frac{٣٠}{٥} = ٦$$

تمارين (٦)

س١: حل كلاً مما يلي :-

- 1 $٢٢ - ٢ب + ٢ب - ٢ب - ٢ب$
- 2 $٥ب + ٥س + ٥س + ٥س + ٥س + ٥س$
- 3 $٢س - ٢ص + ٢س - ٢س - ٢س - ٢س$
- 4 $٣ج - ٣س + ٣س - ٣س - ٣س - ٣ج$
- 5 $٢ج - ٢ج + ٢ج - ٢ج + ٢ج - ٢ج$
- 6 $٣س + ٣ص + ٣ص + ٣س + ٣س + ٣س$
- 7 $٢س + ٢س + ٢س + ٢س + ٢س + ٢س$
- 8 $٢س - ٢س + ٢س - ٢س - ٢س - ٢س$
- 9 $٣ب + ٣ب - ٣ب - ٣ب - ٣ب - ٣ب$
- 10 $٢س + ٢س - ٢س - ٢س - ٢س - ٢س$
- 11 $٢٥س - ٢٥ص - ٢٥ص - ٢٥ص - ٢٥ص - ٢٥ص$
- 12 $٤س + ٢٥س + ٢٥ص + ٢٥ص - ٩$
- 13 $٣س = ٣س + ٣س = ٣ص$
- 14 $٢س - ٢س + ٢س - ٢س - ٢٧$
- 15 $٢س - ٢س - ٢س - ٢س - ٩$
- 16 $٧س - ٢٨س + ٢س - ٢س$
- 17 $٢ب + ٢م - ٢ب - ٢م - ٢م - ٢م$
- 18 $٢س - ٢ج - ٢ج - ٢ج - ٢ج - ٢ج$
- 19 $٥ل - ١٠م - ٢ل + ٢م$
- 20 $٢س - ٤ص - ٢س - ٥س + ١٠ص$
- 21 $٢س - ٦س + ٢ص + ٩ص - ٢ع$
- 22 $٢ب - ٢ب + ٢ب - ٢ب$

التحليل بالتقسيم

نستخدم التحليل بالتقسيم إذا كان المقدار الجبري مكون من أربعة حدود

مثال ١ حل كلاً مما يلي تحليلًا كاملاً:-

$$١ \quad ٢س + ٢ب + ٢س + ٢ب$$

$$\text{الحل:} \quad (٢س + ٢ب) + (٢س + ٢ب) =$$

$$= (٢س + ٢ب) + (٢س + ٢ب) =$$

$$= (٢س + ٢ب) (٢س + ٢ب)$$

$$٢ \quad ٢٢ب - ٢٢ب - ٢٢ب - ٢٢ب$$

$$\text{الحل:} \quad (٢٢ب - ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب - ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب - ٢٢ب) (٢٢ب - ٢٢ب)$$

$$٣ \quad ٢٢ب - ٢٢ب + ٢٢ب - ٢٢ب$$

$$\text{الحل:} \quad (٢٢ب - ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب - ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب - ٢٢ب) (٢٢ب - ٢٢ب)$$

$$٤ \quad ٢٢ص + ٢٢ص - ٢٢ص - ٢٢ص$$

$$\text{الحل:} \quad (٢٢ص + ٢٢ص) + (٢٢ص - ٢٢ص) =$$

$$= (٢٢ص + ٢٢ص) + (٢٢ص - ٢٢ص) =$$

$$= (٢٢ص + ٢٢ص) (٢٢ص - ٢٢ص)$$

$$٥ \quad ٢س - ٢س - ٢س - ٢س$$

$$\text{الحل:} \quad (٢س - ٢س) + (٢س - ٢س) =$$

$$= (٢س - ٢س) + (٢س - ٢س) =$$

$$= (٢س - ٢س) (٢س - ٢س)$$

$$٦ \quad ٢٢ب + ٢٢ب - ٢٢ب - ٢٢ب$$

$$\text{الحل:} \quad (٢٢ب + ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب + ٢٢ب) + (٢٢ب - ٢٢ب) =$$

$$= (٢٢ب + ٢٢ب) (٢٢ب - ٢٢ب)$$

تمارين (٧)

س١: حلل كلام من المقادير الاتية

1 $٤ م + ١$

2 $٦٤ ب + ٤$

3 $٨١ س + ٤ ع$

4 $٦٤ س + ٤ ص$

5 $٦٢٥ س + ٤ ع$

6 $٤٤ س + ٣ ص$

7 $٦٤ ب + ١$

8 $٤ س + ٨١ ص$

9 $٦٤ س + ٨١ ص$

10 $٨١ س + ٩ ص$

11 $٩ س - ٢٥ س$

12 $١١ م - ١١ م + ٢ ن$

13 $٣٦ س + ٥١ س + ٢٥$

14 $٤ م + ٢٥٠٠ ب$

15 $٤ س + ٣ س + ٢ ص + ٤ ص$

16 $٤ س + ٢ س + ٢ ص + ٢٥ ص$

17 $٤ س + ٤ ص - ٧ س + ٢ ص$

18 $٦٨ س - ٢٨ س + ٩ ص$

19 $٤٤ س + ٢٥ ص - ٢٩ س + ٢ ص$

20 $٤ م + ١٨ م - ٢ ن$

21 $٢٥ س + ٩ ص - ٤٤ س + ٢ ص$

التحليل بإكمال المربع

مثال ١ حلل كلام من المقادير الآتية

١ $٤ س + ٤ ص$

الحل:

$$\begin{aligned} &= (٤ س + ٤ ص + ٢ ص + ٢ ص) - (٤ س + ٤ ص) \\ &= (٤ س + ٤ ص + ٢ ص + ٢ ص) - (٤ س + ٤ ص) \\ &= (٤ س + ٤ ص + ٢ ص + ٢ ص) - (٤ س + ٤ ص) \end{aligned}$$

٢ $٦٤ س + ٤$

الحل:

$$\begin{aligned} &= (٦٤ س + ٤ + ٨ س + ٨ س) - (٦٤ س + ٤) \\ &= (٦٤ س + ٤ + ٨ س + ٨ س) - (٦٤ س + ٤) \\ &= (٦٤ س + ٤ + ٨ س + ٨ س) - (٦٤ س + ٤) \end{aligned}$$

٣ $٩ س + ٢ س + ١$

الحل:

$$\begin{aligned} &= (٩ س + ٢ س + ١ + ١) - (٩ س + ٢ س) \\ &= (٩ س + ٢ س + ١ + ١) - (٩ س + ٢ س) \\ &= (٩ س + ٢ س + ١ + ١) - (٩ س + ٢ س) \end{aligned}$$

٤ $٤ م + ٤ ب + ١٦ ب$

الحل:

$$\begin{aligned} &= (٤ م + ٤ ب + ١٦ ب + ١٦ ب) - (٤ م + ٤ ب) \\ &= (٤ م + ٤ ب + ١٦ ب + ١٦ ب) - (٤ م + ٤ ب) \\ &= (٤ م + ٤ ب + ١٦ ب + ١٦ ب) - (٤ م + ٤ ب) \end{aligned}$$

حل معادلة الدرجة الثانية في مجهول واحد

القاعدة

إذا كان $س \times ص = ٠$ فإن :
إما $س = ٠$ وإما $ص = ٠$

مثال ١ أوجد في ح مجموعة حل كل من

١ $س^٢ - ٨س + ١٥ = ٠$

الحل :

$$٠ = (س - ٥)(س - ٣)$$

$$س = ٥ \quad س = ٣$$

$$س = ٥$$

$$س = ٣$$

$$ح.م = \{٥, ٣\}$$

٢ $س^٢ - ٩ = ٠$

الحل :

$$٠ = (س + ٣)(س - ٣)$$

$$س = ٣ + س$$

$$س = ٣ - س$$

$$س = ٣ -$$

$$س = ٣$$

$$ح.م = \{٣ - , ٣\}$$

٣ $س^٢ - ٢س - ٤٨ = ٠$

الحل :

$$٠ = (س + ٦)(س - ٨)$$

$$س = ٨ - س \quad \text{أو} \quad س = ٦ + س$$

$$س = ٦ -$$

$$س = ٨$$

$$\therefore ح.م = \{٦ - , ٨\}$$

٤ $س^٢ - ٥س = ٠$

الحل :

$$٠ = (س - ٥)س$$

$$س = ٥ - س \quad \text{أو} \quad س = ٥$$

$$س = ٥$$

$$س = \frac{٥}{٢}$$

$$\therefore ح.م = \{٠, \frac{٥}{٢}\}$$

٥ $س^٢ - ٦٠ = -١٤س$

الحل :

$$س^٢ + ١٤س - ٦٠ = ٠$$

$$٢ (س^٢ + ٧س - ٣٠) = ٠$$

$$٢ (س - ٣)(س + ١٠) = ٠$$

$$س = ٣ - س \quad س = ١٠ + س$$

$$س = ٣ \quad س = ١٠ -$$

$$ح.م = \{٣, ١٠ -\}$$

٦ $٥ = (س + ١)(س - ٣)$

الحل :

$$٥ = ٣ - س - س^٢$$

$$٠ = ٥ - ٣ - س^٢$$

$$٠ = ٨ - س^٢$$

$$٠ = (س - ٤)(س + ٢)$$

$$س = ٤ - س \quad س = ٢ + س$$

$$س = ٤$$

$$س = ٢ -$$

$$ح.م = \{٤, ٢ -\}$$

٧ $٠ = س^٢ + ٢٥س$

الحل :

$$ح.م = \emptyset$$

٨ $٠ = س^٢ + ٤$

الحل :

$$ح.م = \emptyset$$

تمارين (٨)

س١ : أوجد في ح مجموعة حل المعادلات الآتية :-

$$[٢] \text{ س } ٢ - ٨ \text{ س } + ١٥ = ٠$$

$$[٤] \text{ س } ٢ - ٥ \text{ س } - ٦ = ٠$$

$$[٦] \text{ س } ٢ - \text{س} - ٢٠ = ٠$$

$$[٨] \text{ س } ٢ - ١ = ٠$$

$$[١٠] \text{ س } ٢ - ١٠٠ = ٠$$

$$[١٢] \text{ س } ٢ + ٢٥ = ٠$$

$$[١٤] \text{ س } ٢ = ٢$$

$$[١٦] \text{ س } ٢ = -٣ \text{ س}$$

$$[١٨] \text{ س } ٢ - ٦ \text{ س } + ٩ = ٠$$

$$[٢٠] \text{ س } ٢ + ٤ \text{ س } + ٤ = ٠$$

$$[٢٢] \text{ س } ٢ = ١$$

$$[٢٤] \text{ س } ٢ = ٩$$

$$[٢٦] \text{ س } (٣ + \text{س}) = ١٠$$

$$[٢٨] \text{ س } (٣ - \text{س}) (١ + \text{س}) = ٥$$

$$[٣٠] \text{ س } (٣ + \text{س}) - ٤٩ = ٠$$

$$[٣٢] \text{ س } (٣ + \text{س}) + ٣ - (٣ + \text{س}) = ١٠$$

$$[٣٤] \text{ س } (٣ - \text{س}) = ٥$$

$$[٣٦] \text{ س } ٢ = ١٥ - ٢$$

$$[٣٨] \text{ س } ٢ = ٤٩$$

$$[١] \text{ س } ٢ - ٧ \text{ س } + ١٢ = ٠$$

$$[٣] \text{ س } ٢ + ٥ \text{ س } + ٦ = ٠$$

$$[٥] \text{ س } ٢ \text{ س } ٢ = ٢٤$$

$$[٧] \text{ س } ٢ + ٣ \text{ س} - ١٠ = ٠$$

$$[٩] \text{ س } ٢ = ٩$$

$$[١١] \text{ س } ٢ = ٩$$

$$[١٣] \text{ س } ٢ = \text{س}$$

$$[١٥] \text{ س } ٢ = - \text{س}$$

$$[١٧] \text{ س } ٣ = \text{س}$$

$$[١٩] \text{ س } ٢ - ٢ \text{ س } + ١ = ٠$$

$$[٢١] \text{ س } ٢ + ١٠ \text{ س } + ٢٥ = ٠$$

$$[٢٣] \text{ س } ٢ = ٤$$

$$[٢٥] \text{ س } (٥ - \text{س}) + ٦ = ٠$$

$$[٢٧] \text{ س } (٤ + \text{س}) (٢ - \text{س}) + ٥ = ٠$$

$$[٢٩] \text{ س } (٨ + \text{س}) (٣ - \text{س}) = ٣$$

$$[٣١] \text{ س } (١ - \text{س}) + ٣ = ٣$$

$$[٣٣] \text{ س } (٢ - \text{س}) - ٨١ = ٢$$

$$[٣٥] \text{ س } (٥ + \text{س}) - ٩ = ٠$$

$$[٣٧] \text{ س } ٢ = (٤ - ٣ \text{س})$$

س٢ : أكمل ما يلي :-

(١) مجموعة حل المعادلة $\text{س} (٧ - \text{س}) = ٠$ في ح هي

(٢) مجموعة حل المعادلة $\text{س} (١ - \text{س}) (٥ + \text{س}) = ٠$ في ح هي

(٣) جذرا المعادلة $\text{س}^٢ = \text{س}$ هما

(٤) إذا كان العدد ٣ أحد جذري المعادلة : $\text{س}^٢ + \text{س} - ج = ٠$ فإن ج =

(٥) المعادلة التي جذراها -٤ ، ٣ هي

تطبيقات على حل المعادلة من الدرجة الثانية في متغير واحد جبرياً

ملاحظات

- (١) العدد s مربعه s^2 وضعفه $2s$
- (٢) العدد s مكعبه s^3 وثلاثة أمثاله $3s$
- (٢) إذا كان عمر أحمد الآن هو s فعمره بعد ٣ سنوات هو : $s + 3$ وعمره قبل ٥ سنوات هو : $s - 5$
- (٣) عدنان أحدهما (يزيّد ، يقل ، الفرق بينهما) عن الآخر بمقدار ٣ نفرضهما s ، $s + 3$
- (٤) عدنان فرديان متتاليان (زوجيان متتاليان) هما : s ، $s + 2$

١ عدد صحيح موجب مربعه يزيّد عن أربعة أمثاله بمقدار ٢١ أوجد هذا العدد

الحل :

نفرض أن العدد = s
 مربعه = s^2 أربعة أمثاله = $4s$
 $s^2 - 4s = 21$
 $s^2 - 4s - 21 = 0$
 $(s - 7)(s + 3) = 0$
 $s = 7$ أو $s = -3$ (مرفوض)
 ∴ العدد = ٧

٢ عدد حقيقي إذا أضيف إليه مربعه كان الناتج ١٢ أوجد العدد .

الحل :

نفرض العدد = s ، مربعه = s^2
 $s^2 + s = 12$
 $s^2 + s - 12 = 0$
 $(s - 3)(s + 4) = 0$
 $s = 3$ أو $s = -4$
 العدد = ٣ أو -٤

٣ عدد صحيح موجب مربعه يزيّد عن ضعفه بمقدار ٨ أوجد هذا العدد

الحل :

نفرض أن العدد = s مربعه = s^2 ضعفه = $2s$
 $s^2 - 2s = 8$
 $s^2 - 2s - 8 = 0$
 $(s - 4)(s + 2) = 0$
 $s = 4$ أو $s = -2$ (مرفوض)
 ∴ العدد = ٤

٤ مستطيل طوله يزيّد عن عرضه بمقدار ٣ ومساحته ٢٨ سم^٢ أوجد محيطه ؟

الحل :

نفرض أن : عرضه = s ، طوله = $s + 3$
 مساحته = ٢٨
 $s(s + 3) = 28$
 $s^2 + 3s - 28 = 0$
 $(s - 4)(s + 7) = 0$
 $s = 4$ أو $s = -7$ (مرفوض)
 ∴ عرضه = ٤ سم وطوله = ٧ سم
 محيطه = $2(4 + 7) = 22$ سم

تمارين (٩)

- س١ : عدد صحيح موجب إذا أضيف مربعة إلى ثلاثة أمثاله كان الناتج ١٠ فما العدد؟
- س٢ : أوجد العدد النسبي الذي أربعة أمثال مربعه يساوي ٨١ ؟
- س٣ : عدد صحيح موجب يزيد مربعه عن خمسة أمثاله بمقدار ٦ فأوجد هذا العدد؟
- س٤ : عدد صحيح موجب مربعه يزيد عنه بمقدار ٢٠ أوجد هذا العدد؟
- س٥ : عددان صحيحان موجبان الفرق بينهما ٤ ومجموع مربعيهما يزيد عن حاصل ضربيهما بمقدار ٣٧ أوجد العددان ؟
- س٦ : النسبة بين ثلاث أعداد نسبية موجبة كنسبة ٣ : ٤ : ٥
- الأول والثاني يزيد عن ٧ أمثال العدد الثالث بمقدار ٥٢ أوجد الأعداد الثلاثة ؟
- س٧ : عددان صحيحان زوجيان متتاليان مجموع مربعيهما ١٠٠ أوجد العددان ؟
- س٨ : عددان الفرق بينهما ٥ ومجموع مربعيهما ٧٣ أوجد العددان ؟
- س٩ : عدد صحيح موجب مربعه يساوي ثلاث أمثاله فما هو هذا العدد؟
- س١٠ : أوجد العددين اللذين يزيد أحدهما عن الآخر بمقدار ٢ ومجموع مربعيهما ٧٤ ؟
- س١١ : مربع عمر يوسف الآن يزيد عن ثلاث أمثال عمره منذ ٤ سنوات بمقدار ١٩٢ أوجد عمره الآن ؟
- س١٢ : مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٢ ومساحته = ٢٤ سم^٢ فأوجد أبعاده؟
- س١٣ : مستطيل طوله يزيد عن عرضه بمقدار ٣ ومساحته ٢٨ سم^٢ أوجد محيطه ؟
- س١٤ : عددان فرديان متتاليان مجموع مربعيهما ٣٤ أوجد هذان العددان ؟
- س١٥ : [م] إذا كان ٩س = $2(20) - 2(25)$ أوجد قيمة س
- [ب] إذا كان ٣س = $2(20) - 2(35)$ أوجد قيمة س

س١٦ : أكمل ما يلي :

- (١) إذا كان عمر محمد الآن س فإن عمره منذ ٣ سنوات هو
- (٢) إذا كان عمر يوسف الآن س فإن عمره بعد ٣ سنوات هو
- (٣) إذا كان عمر محمد منذ ٥ سنوات = س فإن عمره الآن هو
- (٤) إذا كان عمر جنة بعد ثلاث سنوات من الآن هو س فإن عمرها الآن هو
- (٥) إذا كان عمر يوسف الآن يساوي س + ١ فإن عمره منذ ٥ سنوات هو
- (٦) إذا كان عمر هدير منذ ٤ سنوات يساوي س + ٢ فإن عمرها الآن هو
- (٧) إذا كان عمر أحمد منذ ٥ سنوات يساوي س + ٣ فإن عمره الآن هو
- (٨) إذا كان عمر هدير الآن = س فإن مربع عمرها بعد ٣ سنوات من الآن هو
- (٩) ثلاث أمثال مربع العدد س هو
- (١٠) إذا كان عمر هدير الآن = س فإن ضعف عمرها منذ ٣ سنوات هو

القوى الصحيحة السالبة والغير سالبة

قواعد هامة

$$(1) \quad p^m \times p^n = p^{m+n}$$

$$(2) \quad p^m \div p^n = p^{m-n}$$

$$(3) \quad p^0 = 1 \quad \text{بشرط } p \neq \text{صفر}$$

$$(ص - ٥) = ١ \quad \text{بشرط } ص \neq ٥$$

$$(ص + ٣) = ١ \quad \text{بشرط } ص \neq -٣$$

$$(4) \quad p^{-n} = \frac{1}{p^n}$$

$$(5) \quad (p^a)^b = p^{a \times b}$$

$$(6) \quad (p^m)^n = p^{m \times n}$$

مثال ١ أوجد ناتج ما يأتى فى أبسط صورة :

$$(1) \quad (٥٦)^3 = ١٢٥$$

$$(2) \quad (٢٦)^4 = ٥$$

$$(3) \quad ٢٥ = (٥٦)^3 = (٥٦)^7 \div (٥٦)^٢$$

$$(4) \quad \frac{1}{9} = \frac{1}{(٣٦)^4} = (٣٦)^{-٤}$$

$$(5) \quad (٢٦)^{-٨} \times (٣)^4$$

$$\frac{1}{(٢٦)^8} \times ٨١$$

$$\frac{٨١}{١٦} = \frac{1}{١٦} \times ٨١$$

$$(٦) \quad \frac{٣(٣٦) \times ٥(٣٦)}{٤(٣٦)}$$

$$٩ = ٤(٣٦) = ٤^{-٣+٥}(٣٦) =$$

$$(٧) \quad \frac{٢-٣ \times ٥(٢٦)}{٩(٢٦) \times ٣}$$

$$٣-٣ \times ٤-(٢٦) = ١-٢-٣ \times ٩-٥(٢٦) =$$

$$\frac{1}{١٠٨} = \frac{1}{٢٧} \times \frac{1}{٤} =$$

$$(٨) \quad \frac{٤س \times ٣٢س}{١٦س \times ٨س}$$

$$١ = ٢ = \frac{٢س٧}{٢س٧} = \frac{٢س٢ \times ٢س٥}{٢س٣ \times ٢س٤}$$

$$(٩) \quad \frac{١+س(٦٢٥) \times ٣-س(٢٥)}{١-س٢(١٢٥)}$$

$$= \frac{١+س(٤٥) \times ٣-س(٢٥)}{١-س٢(٣٥)}$$

$$= \frac{٥س٤+٤ \times ٥س٦-٢س٢}{٥س٦-٣}$$

$$٥ = ٣+س٦-٢-س٦ \quad ٥ = \frac{٢-س٦}{٣-س٦} =$$

المعادلات الأسية

ملاحظات

(١) إذا كان الأساس = الأساس فإن

$$الم = الم \iff الم = الم \iff الم = الم$$

(٢) إذا كان الأس = الأس فإن :

الأساس = الأساس أو (الأس = صفر)

$$\left. \begin{array}{l} ن = م \\ ن زوجي \\ ن زوجي \end{array} \right\} \begin{array}{l} م = م \\ م = م \\ م = م \end{array} \quad \text{أو} \quad \left. \begin{array}{l} م = م \\ م = م \\ م = م \end{array} \right\} \begin{array}{l} م = م \\ م = م \\ م = م \end{array}$$

(٣) $م = م \iff م = م$ صفر

الأس = صفر ، $م \geq ١$ ، $\{١, ٠, -١\}$

مثال ١ أوجد قيمة م في كل مما يأتي :

$$٨ = م٢ (١)$$

$$٣٢ = م٢$$

$$٣ = م \leftarrow$$

$$٦٢٥ = م٣ - م٢ (٢)$$

$$٤٥ = م٤ - م٢$$

$$٤ = م٤ - م٢ \leftarrow$$

$$٤ + ٤ = م٢$$

$$٢ \div ٨ = م٢$$

$$٤ = م$$

$$\frac{٩}{٤} = م^{-١} \times م^{-٢} (٣)$$

$$\left(\frac{٣}{٢}\right) = م^{-١} \left(\frac{٢}{٣}\right) \leftarrow \frac{٢٣}{٢٢} = \frac{١-م٢}{١-م٣}$$

$$٢- = ١- م \leftarrow \left(\frac{٢}{٣}\right) = م^{-١} \left(\frac{٢}{٣}\right)$$

$$١- = م$$

$$\frac{١}{٣٢} = م^٥ (٤)$$

$$\frac{١}{٢} = م \leftarrow \left(-\frac{١}{٢}\right) = \frac{١}{٥٢} = م^٥$$

$$\frac{١٢٥}{٢٧} = م^{٢+٣} \left(-\frac{٣}{٥}\right) (٥)$$

$$٣ \left(-\frac{٥}{٣}\right) = \frac{٣٥}{٣٣} = م^{٢+٣} \left(-\frac{٣}{٥}\right)$$

$$٣- \left(-\frac{٣}{٥}\right) = م^{٢+٣} \left(-\frac{٣}{٥}\right)$$

$$٣- = ٢+ م \leftarrow$$

$$٢- ٣- = م$$

$$٥- = م$$

$$٥+ م \left(\frac{٣}{٢}\right) = ٣- م \left(\frac{٣}{٢}\right) (٦)$$

$$٥+ م \left(\frac{٣}{٢}\right) = ٦- م٢ \left(\frac{٣}{٢}\right)$$

$$٥+ م = ٦- م٢ \leftarrow$$

$$٦+ ٥ = م- م٢$$

$$١١ = م$$

$$١ = م٢-٤ (٧)$$

$$٠ = م٢-٤ \leftarrow$$

$$٢- \div$$

$$٤- = م٢-$$

$$٢ = م$$

$$٩ = م^{-١} \left(\frac{٣}{٢}\right) (٨)$$

$$٤ \left(\frac{٣}{٢}\right) = م^{-١} \left(\frac{٣}{٢}\right)$$

$$٤ = ١- م \leftarrow$$

$$١+ ٤ = م$$

$$٥ = م$$

$$\frac{١}{١٦} = م^{١٠-٣} (٩)$$

$$٢- ٤ = \frac{١}{٢} = م^{١٠-٣}$$

$$٢- = ١٠- م \leftarrow$$

$$١٠+ ٢- = م$$

$$٨ = م$$

$$(٦) \text{ إذا كان } ٢^س = ٣ \text{ فإن } ٨^{-س} = ٠٠٠٠$$

$$٨^{-س} = (٢^٣)^{-س} = (٢^س)^{-٣} = ٢^{-٣}$$

$$(٣)^{-٣} = \frac{١}{٣^٣} = \frac{١}{٢٧}$$

$$(٧) \text{ إذا كان } (٥ - س) \text{ صفر} = ١$$

$$\text{فإن س} \ni ٥$$

$$\leftarrow \text{س} \ni ٥ - \{٥\}$$

$$(٨) \text{ نصف العدد } ١٠٢ = ٠٠٠٠$$

$$\leftarrow \frac{١٠٢}{٢} = ٥١$$

$$(٩) \text{ } ٤ + ٤ + ٤ + ٤ + ٤ = ٠٠٠٠$$

$$٤ + ٤ + ٤ + ٤ + ٤$$

$$٤ = ٤ \times ١ = (١ + ١ + ١ + ١) \times ١$$

$$(١٠) \text{ إذا كان } ٢^س = ٧, \text{ فإن } ٨ = ٧$$

$$\text{فإن س ص} = ٠٠٠٠$$

$$٧ = ٧ = (٢^س) = ٢^س = ٨$$

$$٢^س = ٢^٣$$

$$\text{س ص} = ٣$$

$$(١٠) \text{ إذا كان } ٨^س \times ٩^س = ٦٤ \text{ أوجد قيمة } ٤^{-س}$$

$$\frac{٨^س \times ٩^س}{٨^س \times ٩^س} = \frac{٨^س \times ٩^س}{٨^س \times ٩^س}$$

$$٢^س = ٢^٣$$

$$٢^س = ٢^٣$$

$$٢ = ٢$$

$$\text{س} = ٣$$

$$٤^{-س} = ٤^{-٣} = \frac{١}{٤^٣} = \frac{١}{٦٤}$$

مثال ٢ أكمل ما يأتى :

$$(١) \text{ إذا كان } ٣^س = ٢٧ \text{ فإن س} = ٠٠٠٠$$

$$٢٧ = ٣^٣$$

$$\leftarrow \text{س} = ٣$$

$$(٢) \text{ إذا كان } ٢^س = ٥ \text{ فإن } ٨^س = ٠٠٠٠$$

$$٨^س = (٢^٣)^س = (٢^س)^٣ = (٥)^٣ = ١٢٥$$

$$(٣) \text{ إذا كان } ٥^س = ٣ \text{ فإن } ٥^{س+٢} = ٠٠٠٠$$

$$٥^{س+٢} = ٥^س \times ٥^٢ = ٣ \times ٢٥ = ٧٥$$

$$(٤) \text{ إذا كان } ٥^س = ٤ \text{ فإن } ٥^{-س} = ٠٠٠٠$$

$$٥^{-س} = \frac{١}{٥^س} = \frac{١}{٤} = \frac{١}{٤}$$

$$(٥) \text{ إذا كان } ٣^س = ٥, \text{ فإن } ٧ = \frac{١}{٣^س}$$

$$\text{فإن س ص} = ٠٠٠٠$$

$$\therefore \frac{١}{٣^س} = ٧ \therefore \text{س} = ٣$$

$$\text{س ص} = ٣$$

$$\frac{٥}{٧} = \frac{١}{٧} \times ٥ =$$

تمارين (١٠)

س٤ أختصر لأبسط صورة :

$$\begin{aligned} [1] & \frac{9^s \times 3^{s+2}}{27^s} \\ [2] & \frac{2^{s+1} \times 10^s}{1^s \times 5^s} \\ [3] & \frac{8^s \times 27^s}{1^s \times 27^s} \\ [4] & \frac{2^s \times 27^s}{1^s \times 3^s} \\ [5] & \frac{8^{s-2} \times 6^{s-7} \times 9^{s-2}}{3^{s+2} \times 1^{s-2} \times 3^s} \\ [6] & \frac{81^s \times 625^s}{15^s} \\ [7] & \frac{(2^s)^0 \times (2^s)^{-1}}{(2^s)^{11}} \\ [8] & \frac{8^{s-2} \times 6^{s-7} \times 9^{s-2}}{3^{s+2} \times 1^{s-2} \times 3^s} \end{aligned}$$

حل المعادلة :

$$49 = \frac{(14)^{s+1} \times 4^s}{16^s \times 7^s \times 4^s}$$

$$6 = \frac{6^{s-3}}{1^{s-3} \times 3^s} \quad \text{إذا كان :} \quad \text{أوجد قيمة : } s$$

$$\frac{1}{16} = \frac{4^s \times (3^s)^s}{4^s \times 9^s} \quad \text{إذا كان :} \quad \text{أوجد قيمة : } s$$

أوجد قيمة :

$$\frac{1}{8-\sqrt{3}} + \left(\frac{1}{2\sqrt{2}} - \right) + (2)^{\text{صفر}}$$

س١ أوجد مجموعة حل المعادلات الآتية في ح :

$$\begin{aligned} [1] & \left(\frac{5}{4} \right)^{s+3} = \frac{25}{4} \\ [2] & (2)^{s-3} = (2^s)^{-3} \\ [3] & 16 = (1-s)^4 \\ [4] & 1 = (2)^{s-2} \\ [5] & 1 = 3^{s-1} \\ [6] & \frac{81}{16} = \left(\frac{2}{3} \right)^{s-3} \\ [7] & \frac{1}{32} = 2^s \times 4^s \\ [8] & 8^{s-2} = 3^{s-5} \\ [9] & 32 = 2^{s-1} \\ [10] & \frac{1}{9} = 3^{s-3} \\ [11] & 3^{s-5} = 5^s - 5 \end{aligned}$$

س٢ إذا كان : $s = 2$ ، $v = 3$ أوجد قيمة :

$$\begin{aligned} [1] & (s^2 v^{-4})^{-3} \\ [2] & (s v v)^{-5} \end{aligned}$$

س٣ أكمل ما يلي :

$$\begin{aligned} 1 & \text{ إذا كان : } 5^s = 125 \text{ فإن : } s = \dots \\ 2 & \text{ إذا كان : } 3^s = 9 \text{ فإن : } 2^s - 1 = \dots \\ 3 & \text{ إذا كان : } 3^s = 1 \text{ فإن : } s = \dots \\ 4 & \text{ إذا كان : } 3^s = 3^{-5} \text{ فإن : } s = \dots \\ 5 & \text{ إذا كان : } 3^s = 5 \text{ فإن : } 9^s = \dots \\ 6 & \text{ إذا كان : } \sqrt{v} = \text{ص} , (\sqrt{v})^{-1} = \dots \text{ فإن : } s^5 \text{ ص} = \dots \\ 7 & \text{ إذا كان : } 5^s = 1^{-3} \text{ فإن : } s = \dots \\ 8 & \text{ إذا كان : } 5^s = 3 \text{ فإن : } 5^{s+2} = \dots \\ 9 & \text{ سدس العدد } 2^{13} \times 3^{13} = \dots \\ 10 & \text{ إذا كان : } 3^s = 5 \text{ فإن : } 3^{s-1} = \dots \\ 11 & 3^{\dots} = 3^5 + 3^5 + 3^5 \end{aligned}$$

الإحصاء

الاحتمال

التجربة العشوائية:

هي تجربة نستطيع معرفة جميع نواتجها الممكنة قبل إجرائها ،
ولكن لا يمكن تحديد الناتج الذي سيحدث فعلا

فضاء العينة: هو مجموعة جميع النواتج الممكنة للتجربة العشوائية و عدد عناصرها هو n (ف)

مثال ١-: في تجربة ألقاء قطعة نقود مرة واحدة أكتب فضاء العينة

$$\leftarrow \text{ف} = \{ \text{ص} , \text{ك} \}$$

مثال ٢-: في تجربة ألقاء حجر نرد مرة واحدة اكتب فضاء العينة .

$$\leftarrow \text{ف} = \{ ١ , ٢ , ٣ , ٤ , ٥ , ٦ \}$$

الحدث: هو مجموعة جزئية من فضاء العينة

إحتمال وقوع أى حدث $A \subset F$ ويرمز له بالرمز $P(A)$ ويكون

$$P(A) = \frac{\text{عدد عناصر الحدث } A}{\text{عدد عناصر فضاء العينة}} \leftarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(F)}$$

ملاحظات

(١) الحدث المستحيل: هو الحدث الذي لا يمكن وقوعه

$$\text{ل (الحدث المستحيل) = صفر} \leftarrow \text{ل } (\emptyset) = \text{صفر}$$

(٢) الحدث المؤكد: هو حدث جميع النواتج الممكنة ف

$$\text{ل (الحدث المؤكد) = ١} \leftarrow \text{ل (ف) = ١}$$

(٣) أحتمال أى حدث لا يقل عن الصفر ولا يزيد عن الواحد الصحيح

$$0 \leq P(A) \leq 1 \leftarrow P(A) \in [0, 1]$$

(٤) إذا كان أحتمال وقوع $A = P(A)$ فإن أحتمال عدم وقوع $A = 1 - P(A)$

فمثلا: إذا كان أحتمال نجاح طالب = ٠,٨

$$\text{فإن أحتمال رسوبه} = 1 - 0,8 = 0,2$$

(٥) أحتمال وقوع نواتج فضاء العينة = ١

$$\text{إذا كان ف} = \{ \text{أ} , \text{ب} , \text{ج} \} \text{ فإن : } P(A) + P(B) + P(C) = 1$$

مثال ٣ : في تجربة القاء قطعة نقود مرة واحدة أوجد

(١) احتمال وقوع صورة (٢) احتمال وقوع كتابة

الحل

ف = { ص ، ك }

$$(١) = \text{أ} = \text{احتمال وقوع صورة} \quad \text{أ} = \{ \text{ص} \} \quad \text{ل} (\text{أ}) = \frac{1}{2}$$
$$(٢) = \text{ب} = \text{احتمال وقوع كتابة} \quad \text{ب} = \{ \text{ك} \} \quad \text{ل} (\text{ب}) = \frac{1}{2}$$

مثال ٤ : في تجربة ألقاء حجر نرد مرة واحدة أكتب فضاء العينة ثم عين
أحتمال كلا من الاحداث الآتية

١ = حدث الحصول على عدد فردي

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{6} = \text{ل} (١) \quad \leftarrow \quad \{ ١ , ٣ , ٥ \} = ١$$

ب = حدث الحصول على عدد يقبل القسمة على ٣

$$\frac{1}{3} = \frac{2}{6} = \text{ل} (\text{ب}) \quad \leftarrow \quad \{ ٣ , ٦ \} = \text{ب}$$

ج = حدث الحصول على أحد عوامل العدد ٦

$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \text{ل} (\text{ج}) \quad \leftarrow \quad \{ ١ , ٢ , ٣ , ٦ \} = \text{ج}$$

٤ = حدث الحصول على عدد يقبل القسمة على ٥

$$\frac{1}{6} = \text{ل} (٤) \quad \leftarrow \quad \{ ٥ \} = ٤$$

هـ = حدث الحصول على عدد أكبر من ٦

$$\text{ل} (\text{هـ}) = \text{صفر} \quad \leftarrow \quad \phi = \text{هـ}$$

و = حدث الحصول على زوجي أولى

$$\frac{1}{6} = \text{ل} (\text{و}) \quad \leftarrow \quad \{ ٢ \} = \text{و}$$

س = حدث الحصول على عدد أقل من ٧

$$\text{ل} (\text{س}) = ١ \quad \leftarrow \quad \{ ١ , ٢ , ٣ , ٤ , ٥ , ٦ \} = \text{س}$$

مثال ٥ : سلة بها ٢٠ كرة بها ٨ كرات حمراء ، ٧ كرات بيضاء ، ٥ كرات صفراء

فإذا سُحبت كرة واحدة عشوائياً أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة

(١) حمراء (٢) حمراء أو صفراء (٣) ليست صفراء

الحل

أحتمال أن تكون الكرة حمراء $\frac{8}{20} = \frac{2}{5}$

احتمال أن تكون الكرة حمراء أو صفراء $\frac{13}{20}$

احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ليست صفراء $\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$

مثال ٦ : حقيبة بها ١٠ بطاقات مرتبة من ١ إلى ١٠ فإذا سُحبت منها بطاقة عشوائياً فأوجد :

١ - احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل عدداً فردياً

$$\frac{1}{2} = \frac{5}{10} = (١) \leftarrow \{ ٩ , ٧ , ٥ , ٣ , ١ \} = ٥$$

٢ - احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل عدداً أولياً

$$\frac{2}{5} = \frac{4}{10} = (ب) \leftarrow \{ ٧ , ٥ , ٣ , ٢ \} = ٤$$

٣ - احتمال أن تكون البطاقة المسحوبة تحمل عدداً يقبل القسمة على ٣

$$\frac{3}{10} = (ح) \leftarrow \{ ٩ , ٦ , ٣ \} = ٣$$

تمارين على الاحصاء

- (١) فصل دراسي به ٤٠ طالب نجح منهم ٣٠ طالب في الرياضيات ، ٢٤ طالب في العلوم ، ٢٠ طالب في المادتين فإذا أختير طالب عشوائياً فأوجد احتمال أن يكون الطالب المختار (٢) ناجحاً في الرياضيات (ب) راسباً في العلوم (د) راسباً في المادتين
- (٢) صندوق به ٣ كرات بيضاء ، ٤ كرات حمراء ، ٥ كرات سوداء كلها متماثلة إلا من حيث اللون فإذا سحبت كرة واحدة عشوائياً فأوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة : (٢) بيضاء (ب) حمراء أو سوداء (د) ليست سوداء
- (٣) صندوق به كرات متماثلة ومرقمة من ١ إلى ١٦ سحبت كرة عشوائياً فما احتمال أن تكون الكرة المسحوبة تحمل : (٢) عدد يقبل القسمة على ٦ (ب) عدد أولي (د) عدد لا يقبل القسمة على ٢
- (٤) سلة بها ٢٥ كرة منها ١٠ كرات حمراء و ٩ خضراء و ٦ كرات بيضاء فإذا سحبت كرة واحدة عشوائياً أوجد احتمال أن تكون الكرة المسحوبة ١- حمراء ٢- بيضاء ٣- خضراء ٤- ليست حمراء ٥- حمراء أو خضراء
- (٥) من مجموعة الأرقام { ٢ ، ٣ ، ٥ } كون عدداً مكون من رقمين مختلفين ثم أوجد كلاً من الأحداث الآتية : (٢) حدث أن يكون رقم العشرات فردياً (ب) حدث أن يكون رقم العشرات زوجياً (د) حدث أن يكون مجموع الرقمين ٧ (٤) حدث أن يكون حاصل ضرب الرقمين ١٥

سؤال (أكمل كلاً مما يأتي)

- (١) احتمال الحدث المستحيل =
- (٢) احتمال الحدث المؤكد =
- (٣) إذا كان احتمال وقوع حدث معين = ٠,٣ فإن احتمال عدم وقوع هذا الحدث =
- (٤) عند لقاء قطعة نقود مرة واحدة فإن احتمال ظهور صورة =
- (٥) إذا كان احتمال نجاح أحد التلاميذ ٨٠٪ فإن احتمال رسوبه =
- (٦) سلة بها ٨ كرات فإذا كان احتمال سحب كرة حمراء يساوي $\frac{٥}{٨}$ فإن عدد الكرات الحمراء في السلة =
- (٧) فصل به ٢١ ولد و ١٥ بنتا فإذا أختير أحد التلاميذ عشوائياً فإن احتمال أن تكون بنتا يساوي
- (٨) احتمال أي حدث $\exists [\dots , \dots]$ =
- (٩) عند إلقاء حجر نرد منتظم مرة واحدة فإن احتمال ظهور عدد زوجي =


هندسة الثاني الاعدادي



تساوي مساحتي متوازي أضلاع او مثلثين


نظرية ١

سطحاً متوازي الأضلاع المشتركين في القاعدة و المحصورين بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة متساويان في المساحة



مثال ١-ال : في الشكل المقابل : $s \parallel p$ ، $ABCD$ و $EFGH$ متوازي أضلاع
برهن أن :

مساحة الشكل $ABCD$ = مساحة الشكل $EFGH$



البرهان

$\therefore ABCD$ ، $EFGH$ و $s \parallel p$

متركان في القاعدة $s \parallel p$ ، $s \parallel p$

$\therefore ABCD = EFGH$

بحذف AEF من الطرفين


\therefore مساحة الشكل $ABCD$ = مساحة الشكل $EFGH$

نتائج على النظرية

(١) مساحة متوازي الأضلاع تساوي مساحة المستطيل المشترك معه في القاعدة و المحصور معه بين مستقيمين متوازيين

(٢) مساحة متوازي الأضلاع = طول القاعدة \times الارتفاع

(٣) متوازيات الأضلاع المحصورة بين مستقيمين متوازيين و قواعدها التي على أحد هذين المستقيمين متساوية في الطول تكون متساوية في المساحة




(٤) مساحة المثلث تساوي نصف مساحة متوازي الأضلاع المشترك معه في القاعدة و المحصور معه بين مستقيمين متوازيين أحدهما يحمل هذه القاعدة المشتركة




(٥) مساحة المثلث = $\frac{1}{2}$ طول القاعدة \times الارتفاع

تارين (١)

(١) في الشكل المقابل




إذا كان $\triangle ABC = 5 \text{ سم}^2$
فان $\triangle ABE = \dots \text{ سم}^2$



(٢) في الشكل المقابل

إذا كان $\triangle ABC = 22 \text{ سم}^2$
فان $\triangle ABE = \dots \text{ سم}^2$



(٣) في الشكل المقابل

إذا كان مساحة متوازي الاضلاع $= 15 \text{ سم}^2$

فان مساحة المستطيل وب ه ع =


(٤) في الشكل المقابل

$\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$

برهن أن :

(١) الشكل $\triangle ABC = \text{الشكل } \triangle OAB$

(٢) $\triangle ABC = \triangle OAB$ ، $\triangle ABC = \triangle OAB$




(٥) في الشكل المقابل

$\triangle ABC$ مربع محيطه $= 24 \text{ سم}$ ، \overline{BE} منتصف \overline{AC}

أوجد طول كل من

\overline{AB} ، \overline{BE} ، مساحة $\triangle ABC$




(١) في الشكل المقابل :

$\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$

اثبت أن :

$$\triangle ABC = \frac{1}{2} \square ABCD$$



البرهان

$\triangle ABC = \frac{1}{2} \square ABCD$ ، $\triangle ABC = \frac{1}{2} \square ABCD$

متركان في القاعدة \overline{BC} ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$

\therefore مساحة $\triangle ABC = \text{مساحة } \triangle OAB$

$\triangle ABC = \triangle OAB$ ، $\triangle ABC = \triangle OAB$

متركان في القاعدة \overline{BC} ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$

\therefore مساحة $\triangle ABC = \frac{1}{2} \square ABCD$

من ١ ، ٢

\therefore مساحة $\triangle ABC = \frac{1}{2} \square ABCD$

(٢) في الشكل المقابل :

$\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$ ، $\overline{AP} \parallel \overline{BO}$

$\triangle ABC = 30 \text{ سم}^2$ ، $\triangle ABC = 30 \text{ سم}^2$

أوجد طول \overline{BC}



مساحة $\square = \text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}$

مساحة $\square = \overline{BC} \times \overline{BE}$

$30 \times 50 = 1500 \text{ سم}^2$


مساحة $\square = \overline{BC} \times \overline{BE}$

$30 \times 50 = 1500 \text{ سم}^2$

$\overline{BC} = 1500 \div 50 = 30 \text{ سم}$

نظرية ٢

المثلثان المرسومان على قاعدة واحدة ورأسهما على مستقيم يوازي هذه القاعدة يكونان متساويان في المساحة




نتائج على النظرية


(١) المثلثات التي قواعدها متساوية في الطول و المحصورة بين مستقيمين متوازيين تكون متساوية في المساحة

في الشكل المقابل :


إذا كان : $SP \parallel AB$ ، $AB = HO$ ، $SO = SC$
 $\Delta PAB = \Delta PBC = \Delta HSO = \Delta HSC$



(٢) متوسط المثلث يقسم سطحه إلى سطحين مثلثين متساويين في المساحة




(٣) المثلثات التي قواعدها متساوية و على مستقيم واحد و مشتركة في الرأس تكون متساوية في مساحة



(٦) في الشكل المقابل :

$AB \parallel DC$ ، مستطيل ، $AD \parallel BC$

برهن أن : $\Delta PAB = \Delta PDC$




(٧) في الشكل المقابل :

مساحة $\Delta PAB = 15$ سم^٢

مساحة $\Delta PBC = 12$ سم^٢

أحسب :

مساحة سطح كل من :




ΔPAB ، ΔPBC

(٨) في الشكل المقابل :

ΔPAB فيه $AB = 10$ سم

$AD = 8$ سم ، $BC = 8$ سم

أوجد ΔPAB ، طول AD




(٩) في الشكل المقابل :

$AB \parallel DC$ ، مستطيل ،

$AD \parallel BC$


أثبت أن :

$\Delta PAB = \Delta PDC$ (الشكل) و ΔPBC



(٤) في الشكل المقابل :

م س متوسط في $\Delta م ب هـ$



أثبت أن :

$$\Delta م ب س = \Delta م هـ س$$

البرهان

\therefore م س متوسط في $\Delta م ب هـ$

$$\therefore \Delta م ب س = \Delta م هـ س \text{ — (1)}$$

\therefore م س متوسط في $\Delta م ب هـ$


$$\therefore \Delta م ب س = \Delta م هـ س \text{ — (2)}$$

بطرح ٢ من ١

$$\therefore \Delta م ب س = \Delta م هـ س$$

(٥) في الشكل المقابل :

$\overline{س م} // \overline{ب ج}$ ، هـ منتصف $\overline{م ب}$ ، ن منتصف $\overline{م ج}$



البرهان

$\overline{ب ج} // \overline{س م}$ ، $\overline{ب ج}$ قاعدة مشتركة

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن س$$

بحذف $\Delta م ب هـ س$ من الطرفين

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن س \text{ — (1)}$$

\therefore م هـ متوسط في $\Delta م ب ج$

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن س \text{ — (2)}$$

\therefore س ن متوسط في $\Delta م ب ج$

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن س \text{ — (3)}$$

من ٣ ، ٢ ، ١

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن س$$

(١) في الشكل المقابل :

س ل // ص ع
س ع \cap ص ل = م
إثبت أن
 $\Delta م س ل = \Delta م ص ع$

البرهان


\therefore س ل // ص ع

$$\therefore \Delta م س ل = \Delta م ص ع$$

بطرح $\Delta م س ل$ من الطرفين

$$\therefore \Delta م س ل = \Delta م ص ع$$

(٢) في الشكل المقابل :



أثبت أن :

$$\Delta م ب ن = \Delta هـ س ن$$

البرهان

\therefore $\overline{س م} // \overline{ب هـ}$ ، $\overline{س م}$ قاعدة مشتركة

$$\therefore \Delta م ب ن = \Delta هـ س ن$$

بطرح $\Delta م ب ن$ من الطرفين

$$\therefore \Delta م ب ن = \Delta هـ س ن \text{ — (1)}$$


$$\therefore \Delta م ب ن = \Delta هـ س ن$$

$$\therefore \Delta م ب ن = \Delta هـ س ن \text{ — (2)}$$

بجمع ٢ ، ١ :

$$\therefore \Delta م ب ن = \Delta هـ س ن$$

(٣) في الشكل المقابل :



أثبت أن :

$$\Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن هـ$$

البرهان

\therefore م س منتصف $\overline{ب ج}$ ، هـ منتصف $\overline{م ج}$

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن هـ \text{ — (1)}$$


بإضافة $\Delta م ب هـ س$ للطرفين :

$$\therefore \Delta م ب هـ س = \Delta م ج ن هـ$$

تمارين (٢)


(٥) في الشكل المقابل :

$\overline{س} \parallel \overline{هـ}$ ، $\overline{هـ}$ منتصف $\overline{بم}$ ، و $\overline{س}$ منتصف $\overline{ج}$
برهن أن : $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$



(٦) في الشكل المقابل :

$\overline{س} \parallel \overline{بج}$ ، و $\overline{س}$ منتصف $\overline{هـ}$
برهن أن : $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$




(١) في الشكل المقابل :

$\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$
 $\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

أثبت أن :

$\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$



(٢) في الشكل المقابل :


$\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

$\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

تقاطع قطراه في م

أثبت أن :

$\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$




(٣) في الشكل المقابل :

$\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

و منتصف $\overline{س}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

أثبت أن :

$\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$




(٤) في الشكل المقابل :

$\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$ ، $\overline{س} \parallel \overline{بم}$

برهن أن :


(١) $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$

(٢) $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$ ، $\Delta س = \Delta ب$




عكس النظرية ٢

المثلثان المتساويان في مساحتهما والمرسومان على قاعدة واحدة وفي جهة واحدة منها يكون رأسهما على مستقيم يوازي هذه القاعدة



(١) في الشكل المقابل :



البرهان


$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

بإضافة : ΔPMS

$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS} \text{ ، قاعدة مشتركة}$$

(٢) في الشكل المقابل :



البرهان

$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS}$ متوسط في ΔJHS

$$\textcircled{1} \therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$$\textcircled{2} \therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$


$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

بإضافة ΔPMS للطرفين

$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS} \text{ ، قاعدة مشتركة}$$

(٣) في الشكل المقابل :



$$\Delta PMS = \Delta PMS$$

أثبت أن

$$\overline{PS} \parallel \overline{MS}$$

البرهان


$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

بطرح ΔPMS من الطرفين

$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS} \text{ قاعدة مشتركة}$$

(٤) في الشكل المقابل :



$$\overline{PS} \parallel \overline{MS}$$

$$\Delta PMS = \Delta PMS$$

أثبت أن :

$$\overline{PS} \parallel \overline{MS}$$

البرهان

$$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS} \text{ ، قاعدة مشتركة}$$

$$\textcircled{1} \therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$$\textcircled{2} \therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

بطرح ٢ من ١

$$\therefore \Delta PMS = \Delta PMS$$

$\overline{PS} \parallel \overline{MS}$ ، قاعدة مشتركة

$$\therefore \overline{PS} \parallel \overline{MS}$$


تمارين (٣)

(٤) في الشكل المقابل :

الشكل $\triangle P$ ب ه م = الشكل $\triangle س و ج$ ، ب ه = ج و
برهن أن :

(١) $\triangle س و ج = \triangle م ه س$

(٢) $\overline{س پ} // \overline{س ج}$




(١) في الشكل المقابل :

$\triangle س و ج = \triangle م ه س$

$\overline{س ه} \cap \overline{م ج} = س$ ، $س و = س ه$

أثبت أن :

$\overline{س پ} // \overline{س ج}$



(٢) في الشكل المقابل :


$\triangle ب ه ج$ متوازي أضلاع

$\overline{س ه} \cap \overline{م ه} = ه$ بحيث

$\triangle س و ج = \triangle م ه س$

أثبت أن :

$\overline{س پ} // \overline{س ج}$



(٣) في الشكل المقابل :


$\overline{س پ} // \overline{س ج}$

$\{م\} = س ج \cap \overline{س ه}$

$\triangle م ه س = \triangle م ب ج$ ،

أثبت أن :

$\overline{س ه} // \overline{م ج}$



مساحة بعض الأشكال الهندسية

أوجد مساحة كلا من الأشكال الآتية :

(١) معين طول ضلعه = ١٠ سم وارتفاعه ٤ سم أوجد مساحته
(الحل):

مساحة المعين = طول ضلعه × ارتفاعه

$$= 10 \times 4 = 40 \text{ سم}^2$$

(٢) معين طول قطريه ١٠ سم ، ٦ سم أوجد مساحته

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times 10 \times 6 = 30 \text{ سم}^2$$

(٣) مربع طول قطره ١٠ سم أوجد مساحته

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{مربع طول قطره}$$

$$= \frac{1}{2} \times 100 = 50 \text{ سم}^2$$

(٤) مربع مساحته ٣٢ سم^٢ أوجد طول قطره

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{مربع طول قطره}$$

$$\frac{1}{2} \times 32 = \text{س}^2 \Rightarrow \text{س}^2 = 64$$

(٥) معين مساحته ٤٠ سم^٢ و طول أحد قطريه ٨ سم أوجد طول قطره الآخر

(الحل):
مساحة المعين = $\frac{1}{2} \times \text{حاصل ضرب طولى القطرين}$

$$40 = \frac{1}{2} \times 8 \times \text{س} \Rightarrow 80 = 8 \times \text{س} \Rightarrow \text{س} = 10 \text{ سم}$$

$$40 = 8 \times \text{س} \Rightarrow 40 \div 8 = \text{س} \Rightarrow 5 = \text{س}$$

(٦) احسب مساحة شبه منحرف طول قاعدته

المتوسطة ٨ سم ارتفاعه ٥ سم
(الحل):

مساحة شبه المنحرف = طول القاعدة المتوسطة × الارتفاع

$$= 5 \times 8 = 40 \text{ سم}^2$$


(٧) احسب مساحة شبه منحرف طول قاعدتيه

٥ سم ، ٩ سم و ارتفاعه ٦ سم
(الحل):

مساحة شبه المنحرف = $\frac{1}{2} \times \text{مجموع طولى القاعدتين المتوازيتين} \times \text{الارتفاع}$

$$= \frac{1}{2} \times (9 + 5) \times 6 = 42 \text{ سم}^2$$


مساحة المعين



مساحة المعين = طول الضلع × الارتفاع

$$\text{مساحة المعين} = \frac{1}{2} \times \text{حاصل ضرب طولى القطرين}$$

مساحة المربع



مساحة المربع = مربع طول ضلعه = س^٢

$$\text{مساحة المربع} = \frac{1}{2} \times \text{مربع طول قطره} = \frac{1}{2} \times \text{س}^2$$

مساحة شبه المنحرف

$$\frac{1}{2} \times \text{مجموع القاعدتين المتوازيتين} \times \text{الارتفاع}$$

$$= \text{القاعدة المتوسطة} \times \text{الارتفاع}$$

$$\text{القاعدة المتوسطة} = \frac{1}{2} \times \text{مجموع القاعدتين المتوازيتين}$$

ملاحظات

(١) زاويتا القاعدة فى شبه المنحرف

متطابق الساقين متطابقتان

(٢) قطرا شبه المنحرف متطابق الساقين متطابقتان

تمارين (٣)

س١ (أكمل ما يأتي)

- (١) مربع طول ضلعه = ٦ سم يكون مساحته = سم
- (٢) مربع مساحته = ٦٤ سم^٢ يكون محيطه = سم
- (٣) مربع مساحته = ٢٥ سم^٢ يكون محيطه = سم
- (٤) مربع محيطه = ١٢ سم^٢ يكون مساحته = سم^٢
- (٥) معين طولاً قطريه ٨ سم، ١٢ سم تكون مساحته تساوى سم^٢
- (٦) متوازى أضلاع طولاً ضلعين متجاورين فيه ٨ سم، ٦ سم، وارتفاعه الأصغر ٣ سم فإن مساحته = سم^٢
- (٧) معين طولاً قطريه ١٠ سم، ٨ سم تكون مساحته.....
- (٨) إذ كانت مساحة مثلث ٢٤ سم^٢ وارتفاعه ٦ سم فإن طول قاعدته المناظرة لهذا الارتفاع =
- (٩) معين مساحته = ٢٨ سم، طول احد قطريه = ٧ سم فإن طول قطره
- (١٠) معين مساحته = ٦٠ سم، طول قاعدته ١٠ سم يكون ارتفاعه
- (١١) شبه منحرف مساحته = ٤٥ سم^٢ طول قاعدته المتوسطة = ٩ سم يكون ارتفاعه
- (١٢) شبه منحرف طولاً قاعدتيه المتوازيين = ٣ سم، ٧ سم ارتفاعه ٤ سم تكون مساحته = سم^٢
- (١٣) شبه منحرف طولاً احدى قاعدتيه المتوازيين ٦ سم وطول قاعدتيه المتوسطة ١ سم تكون قاعدته الاخرى
- (١٤) متوازى الأضلاع الذى طولاً ضلعيه المتجاورين ٩، ٦ وارتفاعه الأصغر ٤ سم تكون مساحته ويكون ارتفاعه الأكبر =

(٨) شبه منحرف مساحته ٤٥٠ سم^٢ و طولاً قاعدتيه المتوازيين ٢٤ سم، ١٢ سم أوجد ارتفاعه

(الحل):

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = ٤٥٠$$

$$\frac{1}{2} (١٢ + ٢٤) \times \text{س} = ٤٥٠$$

$$١٨ \div ٤٥٠ = \text{س} \times ١٨$$

$$\text{س} = ٢٥$$

(٩) شبه منحرف مساحته ١٠٨ سم^٢ و طول أحد قاعدتيه المتوازيين ١٥ سم، ارتفاعه ٨ سم أوجد طول قاعدته الأخرى

(الحل):

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = ١٠٨$$

$$\frac{1}{2} (١٥ + \text{س}) \times ٨ = ١٠٨$$

$$٤ \div ١٠٨ = (\text{س} + ١٥) \times ٤$$

$$٢٧ = \text{س} + ١٥$$

$$\text{س} = ٢٧ - ١٥$$

$$\text{س} = ١٢$$

(١٠) شبه منحرف مساحته ١٨ سم^٢ و ارتفاعه ٢ سم والنسبة بين طولى قاعدتيه المتوازيين ٣:٢ فما طول كل منهما؟

نفرض طولى القاعدتين ٣س، ٢س

$$\text{مساحة شبه المنحرف} = ١٨٠$$

$$\frac{1}{2} (٢س + ٣س) \times ٢ = ١٨٠$$

$$١٨٠ = (٢س + ٣س) \times ٦$$

$$١٨٠ = ٥ \times \text{س}$$

$$٣٠ \div ١٨٠ = \text{س}$$

$$\text{س} = ٦$$

طول القاعدة الكبرى = ٣س = ٦ × ٣ = ١٨ سم

طول القاعدة الصغرى = ٢س = ٦ × ٢ = ١٢ سم

س٢ أوجد مساحة كل من الأشكال الآتية :


- (١) أوجد مساحة سطح معين طولاً قطريه ١٥ سم ، ١٢ سم
- (٢) أوجد طول القاعدة المتوسطة لشبه منحرف طولاً قاعدتيه المتوازيتين ٧ سم ، ١٥ سم
- (٣) أوجد مساحة سطح معين محيطه ٤٠ سم ، و ارتفاعه ٧ سم
- (٤) شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ١٢ سم ، طول إحدى قاعدتيه المتوازيتين ٩ سم
أوجد طول القاعدة الأخرى
- (٥) أوجد مساحة شبه منحرف طولاً قاعدتيه المتوازيتين ٧ سم ، ١٣ سم و ارتفاعه ٥ سم
- (٦) معين طولاً قطريه ١٦ سم ، ١٢ سم ، وطول ضلعه ١٠ سم أوجد ارتفاعه
- (٧) شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ٩ سم ، مساحة سطحه ٦٣ سم^٢ أوجد ارتفاعه
- (٨) شبه منحرف ارتفاعه ١٠ سم ، مساحة سطحه ١٥٠ سم^٢ أوجد طول قاعدته المتوسطة
- (٩) مربع مساحته ٤٩ سم^٢ أوجد محيطه
- (١٠) إذا كانت مساحة مربع طول قطره ١٠ سم تساوى مساحة شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ١٠ سم أوجد ارتفاع شبه المنحرف
- (١١) إذا كانت مساحة مربع طول قطره ١٠ سم تساوى مساحة مستطيل أحد بعديه ١٠ سم
أوجد محيط المستطيل
- (١٢) شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة ضعف طول قاعدته الصغرى و ارتفاعه يساوى طول قاعدته الكبرى فإذا كانت مساحته ٥٤ سم^٢ أوجد طول قاعدته الصغرى و ارتفاعه
- (١٣) قطعة أرض على شكل شبه منحرف مساحته ٣٤٣ سم^٢ و ارتفاعه ٧ سم والنسبة بين طولى

التشابه

(١) في الشكل المقابل :

إذا كان: $\Delta م س ص \sim \Delta م ج ب$ أوجد طول س ب ، س ص

البرهان



$$\Delta م س ص \sim \Delta م ج ب$$

$$\therefore \frac{م س}{م ج} = \frac{س ص}{ج ب} = \frac{م ب}{ج ب}$$

$$\therefore \frac{٥}{١٢} = \frac{س ص}{٨} = \frac{٤}{٨}$$


$$\therefore س ص = \frac{١٢ \times ٤}{٨} = ٦ \text{ سم}$$

$$م ب = \frac{٨ \times ٥}{٤} = ١٠ \text{ سم} \quad \leftarrow س ب = ٦ \text{ سم}$$

(٢) في الشكل المقابل : إذا كان

$\Delta ب س ص \sim \Delta ب ج م$ أوجد : م س ، ص ج

البرهان



$$\Delta ب س ص \sim \Delta ب ج م$$

$$\therefore \frac{ب س}{ب ج} = \frac{س ص}{ج م} = \frac{ب م}{ج م}$$

$$\therefore \frac{١٨}{٤} = \frac{س ص}{٦} = \frac{٥}{٦}$$


$$\therefore ب ج = \frac{١٨ \times ٥}{٦} = ١٥ \text{ سم} \quad \leftarrow ص ج = ١١ \text{ سم}$$

$$أ ب = \frac{٤ \times ١٨}{٦} = ١٢ \text{ سم} \quad \leftarrow أ س = ٧ \text{ سم}$$

(٣) في الشكل المقابل : ق (ل ج) = ق (هـ ع هـ) = ق (ل ج)

إثبت أن: $\Delta م ع هـ \sim \Delta م ج ب$ أوجد : م ج

البرهان



$$\Delta م ع هـ \sim \Delta م ج ب$$

$$\therefore \frac{م ع}{م ج} = \frac{ع هـ}{ج ب} = \frac{م ب}{ج ب}$$

$$\therefore \frac{٥}{٨} = \frac{٦}{٦} = \frac{٤}{٨}$$

تعريف يقال لمضلعين أنهما متشابهين إذا تحقق ما يلي :

- (١) زواياهما المتناظرة متساوية في القياس
- (٢) أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة

ملاحظات

(١) تسمى النسبة الثابتة بين أطوال الأضلاع

نسبة التكبير أو نسبة التصغير

نسبة التصغير > ١ ، نسبة التكبير < ١

(٢) إذا كانت نسبة التكبير = ١ فإن المضلعين متطابقين

(٣) كل المضلعات المنتظمة التي لها نفس عدد الأضلاع تكون متشابهة

(٤) النسبة بين محيطي مضلعين متشابهين

تساوي النسبة بين أي طولين ضلعين متناظرين

(٥) يجب كتابة المضلعين المتشابهين بنفس ترتيب الرؤوس المتناظرة

(٦) المضلعان المشابهان لثالث متشابهان

(٧) المضلعان المتطابقان متشابهان والعكس غير صحيح

ملاحظة

إذا كان : المضلع س ص ع ل ~ المضلع د هـ و ف فإن :

$$\begin{aligned} \frac{س}{د} &= \frac{ص}{هـ} = \frac{ع}{و} = \frac{ل}{ح} \\ \frac{س}{د} &= \frac{ص}{هـ} = \frac{ع}{و} = \frac{ل}{ح} \\ \frac{س}{د} &= \frac{ص}{هـ} = \frac{ع}{و} = \frac{ل}{ح} \end{aligned}$$



$$\frac{س}{د} = \frac{ص}{هـ} = \frac{ع}{و} = \frac{ل}{ح} = \text{مقدار ثابت}$$

تعريف يتشابه المثلثان إذا تحقق أحد الشرطين التاليين :

- (١) زواياهما المتناظرة متساوية في القياس
- (٢) أطوال أضلاعهما المتناظرة متناسبة

تمارين (٤)

[١] في الشكل المقابل



البرهان

$\overline{HE} \parallel \overline{AB}$ ∴

① ∴ $\angle PHE = \angle PAB$ بالتناظر ①

② ∴ $\angle PHE = \angle PAB$ بالتناظر ②

③ ∴ $\angle PHE = \angle PAB$ زاوية مشتركة ③


∴ $\triangle PHE \sim \triangle PAB$

$$\frac{PH}{PA} = \frac{PE}{PB} = \frac{HE}{AB}$$

$$\frac{PH}{5} = \frac{PE}{6} = \frac{HE}{6}$$

$$PH = \frac{3 \times 5}{6} = 2.5 \text{ سم} ، PE = \frac{3 \times 6}{6} = 3 \text{ سم}$$

[٢] في الشكل المقابل إذا كان




$\angle PHE = \angle PAB$ ، $\angle PHE = \angle PAB$

$\angle PHE = \angle PAB$ ، $\angle PHE = \angle PAB$


أثبت أن :

$\triangle PHE \sim \triangle PAB$ ثم أوجد طول \overline{HE}


[٣] في الشكل المقابل :




[٤] في الشكل المقابل : إذا كان $PA = 8$ سم




[٥] في الشكل المقابل :




[٦] في الشكل المقابل :




[٧] في الشكل المقابل :




[٨] في الشكل المقابل :




[٩] في الشكل المقابل :




[١٠] في الشكل المقابل :




[١١] في الشكل المقابل :




[١٢] في الشكل المقابل :




[١٣] في الشكل المقابل :




[١٤] في الشكل المقابل :




[١٥] في الشكل المقابل :




[١٦] في الشكل المقابل :




[١٧] في الشكل المقابل :




[١٨] في الشكل المقابل :




[١٩] في الشكل المقابل :




[٢٠] في الشكل المقابل :




[٢١] في الشكل المقابل :




[٢٢] في الشكل المقابل :




[٢٣] في الشكل المقابل :




[٢٤] في الشكل المقابل :




[٢٥] في الشكل المقابل :




[٢٦] في الشكل المقابل :




[٢٧] في الشكل المقابل :




[٢٨] في الشكل المقابل :




[٢٩] في الشكل المقابل :




[٣٠] في الشكل المقابل :




[٣١] في الشكل المقابل :




[٣٢] في الشكل المقابل :




[٣٣] في الشكل المقابل :




[٣٤] في الشكل المقابل :




[٣٥] في الشكل المقابل :




[٣٦] في الشكل المقابل :




[٣٧] في الشكل المقابل :




[٣٨] في الشكل المقابل :




[٣٩] في الشكل المقابل :




[٤٠] في الشكل المقابل :




[٤١] في الشكل المقابل :




[٤٢] في الشكل المقابل :




[٤٣] في الشكل المقابل :




[٤٤] في الشكل المقابل :




[٤٥] في الشكل المقابل :




[٤٦] في الشكل المقابل :




[٤٧] في الشكل المقابل :




[٤٨] في الشكل المقابل :




[٤٩] في الشكل المقابل :




[٥٠] في الشكل المقابل :




[٥١] في الشكل المقابل :




[٥٢] في الشكل المقابل :




[٥٣] في الشكل المقابل :




[٥٤] في الشكل المقابل :




[٥٥] في الشكل المقابل :




[٥٦] في الشكل المقابل :




[٥٧] في الشكل المقابل :




[٥٨] في الشكل المقابل :




[٥٩] في الشكل المقابل :




[٦٠] في الشكل المقابل :




[٦١] في الشكل المقابل :




[٦٢] في الشكل المقابل :




[٦٣] في الشكل المقابل :




[٦٤] في الشكل المقابل :




[٦٥] في الشكل المقابل :




[٦٦] في الشكل المقابل :




[٦٧] في الشكل المقابل :




[٦٨] في الشكل المقابل :




[٦٩] في الشكل المقابل :




[٧٠] في الشكل المقابل :




[٧١] في الشكل المقابل :




[٧٢] في الشكل المقابل :




[٧٣] في الشكل المقابل :




[٧٤] في الشكل المقابل :




[٧٥] في الشكل المقابل :




[٧٦] في الشكل المقابل :




[٧٧] في الشكل المقابل :




[٧٨] في الشكل المقابل :




[٧٩] في الشكل المقابل :



[٨٠] في الشكل المقابل :



[٨١] في الشكل المقابل :



س٦ أكمل العبارات الآتية

١- المثلثان المشابهان لثالث يكونان.....

٢- المثلثان المتطابقان يكونان.....

٣- أي مثلعين..... لهما نفس العدد من.....متشابهان

٤- إذا كانت نسبة التكبير = ١ فإن المثلثان يكونان ...

٥- مثلث قياس زاويتين فيه 70° ، 50° ،
ومثلث آخر قياس زاويتين فيه 70° ، 60° فإنهما يكونان

٦-.....المثلثات المتساوية الاضلاع تكون متشابهة

٧-.....المربعات متشابهة

٨-مثلثان متشابهان النسبة بين طولى ضلعين متناظرين فيهما

١ : ٣ أوجد النسبة بين محيطيهما

٩- شروط تطابق مثلعين هي

١٠- شروط تشابه مثلعين هي

١١- إذا كان المثلثان متطابقان فإن نسبة التكبير =

١٢- مثلثان متشابهان أطوال أضلاع أحدهما ٣ سم ، ٥ سم ، ٧ سم
ومحيط المثلث الآخر = ٣٠ سم فإن أطوال أضلاع المثلث الآخر هي

١٣- إذا كان Δ س ص ع $\sim \Delta$ هـ و ب حيث كان \angle س = 50°

، \angle هـ = 60° فإن


\angle و = (د ع) ، = (د ص) ،

\angle و = (د و) ، = (د ع) ،


(٧) فى الشكل المقابل:

إذا كان Δ ج س ص $\sim \Delta$ ج ب س

أوجد طول : س ج ، س ص



(٨) فى الشكل المقابل :



ب م \perp م هـ ،

هـ م \perp ب هـ


، م ب = ٣ سم ،

م هـ = ٤ سم أثبت أن

(١) Δ م ب هـ $\sim \Delta$ م هـ س

(٢) أوجد طول ب هـ ، هـ س

(٩) فى الشكل المقابل:



ب هـ \cap هـ س = { م }


\angle ب هـ س = 90° ، \angle ب س هـ = 90°

(١) أثبت أن

Δ م ب هـ $\sim \Delta$ م هـ س

(٢) أوجد : ب هـ ، م هـ

(١٠) فى الشكل المقابل :



\angle م ب س = \angle م هـ س (هـ)

م ب = ٦ سم ، م هـ = ٨ سم


م هـ = ٦ سم

(١) أثبت أن: Δ م ب س $\sim \Delta$ م هـ س

(٢) أوجد طول م ب

المساقط


في الشكل المقابل :



- مسقط P على B هو S
- مسقط B على P هو S
- مسقط S على B هو {S}
- مسقط P على S هو P
- مسقط B على S هو P

نظرية فيثاغورث

مساحة المربع المنشأ على الوتر في المثلث القائم الزاوية
يساوي مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائمة




الحل

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$

$$100 = 36 + 64 = 6^2 + 8^2 = AC^2$$

$$AC = 10 \text{ سم}$$



الحل

$$AB^2 + BC^2 = AC^2$$


$$25 + 144 = AC^2$$

$$169 = AC^2$$


$$AC = 13 \text{ سم}$$

(٢) مسقط نقطة على مستقيم

هو موقع العمود المرسوم من تلك النقطة إلى ذلك المستقيم




حالة خاصة إذا كان P ∉



فان مسقطها هو نفسها


(٢) مسقط قطعة مستقيمة على مستقيم يكون

① مسقط قطعة مستقيمة موازية لمستقيم



مسقط \overline{AB} على المستقيم ℓ هو $\overline{A'B'}$
طول \overline{AB} = طول $\overline{A'B'}$


② مسقط قطعة مستقيمة غير موازية لمستقيم



مسقط \overline{AB} على المستقيم ℓ هو $\overline{A'B'}$
طول \overline{AB} > طول $\overline{A'B'}$

③ مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم

مسقط قطعة مستقيمة عمودية على مستقيم
معلوم هو نقطة



ملاحظة

طول مسقط أي قطعة مستقيمة على مستقيم
معلوم \geq طول القطعة المستقيمة الأصلية

عكس نظرية فيثاغورث


إذا كان مربع طول ضلع في مثلث يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين الآخرين كانت الزاوية المقابلة لهذا الضلع قائمة

إذا كان

$$^2(م ب) + ^2(ب م) = ^2(م م)$$

فإن \angle قائمة

مثال ١ : في الشكل المقابل :



البرهان

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

Δ م ب م قائم في ب

$$^2(م ب) + ^2(ب م) = ^2(م م)$$

$$^2(م) = ^2(3) + ^2(4) = 9 + 16 = 25$$

$$م = 5$$

في Δ م س م :

$$م = 5 ، م = 13 ، م = 12$$

$$^2(س م) = ^2(12) = 144$$


$$^2(م) + ^2(س) = ^2(5) + ^2(12) = 25 + 144 = 169$$

$$169 = 144 + 25 =$$

$$^2(س م) = ^2(م) + ^2(س) \therefore$$

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

مثال ٢ : في الشكل المقابل :



$$م ب = 9 ، م = 17$$

$$م ب = 12 ، م = 8$$

$$م = 17 ، م = 9$$

$$\angle م = 90^\circ$$

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

البرهان

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

Δ م ب م قائم في ب

$$^2(م ب) + ^2(ب م) = ^2(م م)$$

$$225 = 81 + 144 = 9^2 + 12^2 =$$

$$م = 15$$

في Δ م س م :

$$م = 15 ، م = 8 ، م = 17$$


$$^2(س م) = ^2(8) = 64$$

$$^2(م) + ^2(س) = ^2(15) + ^2(8) = 225 + 64 = 289$$

$$^2(س م) + ^2(م) = ^2(م م)$$

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

مثال ٣ في الشكل المقابل



Δ م ب م قائم الزاوية في ب

$$م ب = 9 ، م = 12 ، م = 17$$

$$م = 8 ، م = 17 ، م = 9$$

$$\angle م = 90^\circ$$

ثم أوجد مساحة الشكل م ب م

البرهان

Δ م ب م قائم في ب

$$^2(م ب) + ^2(ب م) = ^2(م م)$$

$$225 = 81 + 144 = 9^2 + 12^2 =$$

$$م = 15$$

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$

$$289 = 225 + 64 = ^2(م) + ^2(س)$$

$$\therefore \angle م = 90^\circ$$


$$\therefore \text{مساحة } \Delta \text{ م ب م} = 9 \times 12 \times \frac{1}{2} = 54$$

$$\text{مساحة } \Delta \text{ م ب م} = 8 \times 15 \times \frac{1}{2} = 60$$


$$\text{مساحة الشكل م ب م} = 60 + 54 = 114$$

نظرية إقليدس

مساحة المربع المنشأ على أحد ضلعي القائمة في المثلث القائم الزاوية يساوى مساحة المستطيل الذي بعدها مسقط هذا الضلع على الوتر و طول الوتر



مثال ١ : فى الشكل المقابل




البرهان

∴ ΔPQR قائم فى P ، $PQ \perp QR$ ، $PQ \perp QR$

$$\begin{aligned}
 \therefore (PQ)^2 &= PQ \times QR \\
 \leftarrow (PQ)^2 &= 9 \times 16 = 144 \\
 PQ &= 12 \text{ سم} \\
 (PQ)^2 &= PQ \times QR \\
 \leftarrow (PQ)^2 &= 9 \times 16 = 144 \\
 PQ &= 12 \text{ سم} \\
 (PQ)^2 &= PQ \times QR \\
 \leftarrow (PQ)^2 &= 9 \times 16 = 144 \\
 PQ &= 12 \text{ سم}
 \end{aligned}$$

مثال ٢ : فى الشكل المقابل



البرهان

∴ ΔPQR قائم فى P

$$(PQ)^2 + (PR)^2 = (QR)^2$$

$$100 = 64 + 36 =$$

$$PQ = \sqrt{100} = 10 \text{ سم}$$

∴ ΔPQR قائم فى P ، $PQ \perp QR$ ، $PQ \perp QR$

$$(PQ)^2 = PQ \times QR$$


$$36 = \frac{36}{10} = PQ \times QR$$

$$(PQ)^2 = PQ \times QR$$

$$64 = \frac{64}{10} = PQ \times QR$$

$$PQ \times QR = PQ \times QR$$

مثال ٣ : فى الشكل المقابل



البرهان

∴ ΔPQR قائم فى P

$$(PQ)^2 + (PR)^2 = (QR)^2$$

$$(PQ)^2 = 49 + 576 = 625 \Rightarrow PQ = 25 \text{ سم}$$

∴ ΔPQR قائم فى P

$$(PQ)^2 = PQ \times QR$$

$$225 = 400 - 175 = PQ \times QR$$

∴ ΔPQR قائم فى P ، $PQ \perp QR$ ، $PQ \perp QR$

$$(PQ)^2 = PQ \times QR$$

$$225 = \frac{225}{9} = PQ \times QR$$

$$PQ = 25 - 9 = 16 \text{ سم}$$

التعرف على نوع المثلث بالنسبة لزاياه

يكون المثلث

منفرج الزاوية

إذا كان $\angle(م) + \angle(ب) < \angle(م)$

قائم الزاوية

إذا كان $\angle(م) + \angle(ب) = \angle(م)$

حاد الزاوية

إذا كان $\angle(م) + \angle(ب) > \angle(م)$

مثال ١ : بين نوع كلامن المثلثات الأتية :

(١) $م = ٨$ سم ، $ب = ١٠$ سم ، $م = ٦$ سم

الحل

$$١٠٠ = \angle(١٠) = \angle(م)$$

$$١٠٠ = ٦٤ + ٣٦ = \angle(ب) + \angle(م)$$

$$\angle(ب) + \angle(م) = \angle(م)$$

Δ قائم في م

(٢) $م = ١٢$ سم ، $ب = ١٣$ سم ، $م = ٧$ سم

الحل

$$١٦٩ = \angle(١٣) = \angle(م)$$

$$\angle(٧) + \angle(١٢) = \angle(ب) + \angle(م)$$

$$١٩٣ = ٤٩ + ١٤٤ =$$

$$\angle(ب) + \angle(م) > \angle(م)$$

Δ المثلث حاد الزوايا

(٣) $م = ٣$ سم ، $ب = ٧$ سم ، $م = ٥$ سم

الحل

$$٤٩ = \angle(٧) = \angle(م)$$

$$\angle(٥) + \angle(٣) = \angle(ب) + \angle(م)$$


$$٣٤ = ٢٥ + ٩ =$$

$$\angle(ب) + \angle(م) < \angle(م)$$

Δ منفرج الزاوية في م

تمارين (٥)

(١) في الشكل المقابل



م ب ح د شكل رباعي فيه

$$\angle(ب) = ٩٠^\circ$$

$$م ب = ١٥ \text{ سم}$$

$$ب ح = ٢٠ \text{ سم}$$


$$ج د = ٧ \text{ سم}$$

أوجد طول م ج

ثم أثبت أن $\angle(ع) = ٩٠^\circ$

، أوجد مساحة الشكل م ب ح د

(٢) في الشكل المقابل



م ب ج د شكل رباعي فيه


$$\angle(ب) = ٩٠^\circ$$

$$م ج = ١٢ \text{ سم}$$

$$م ب = ١٣ \text{ سم}$$

$$\angle(ب) = ٩٠^\circ$$

(٣) في الشكل المقابل




$$\angle(ب) = ٩٠^\circ$$

$$م ب = ١٦ \text{ سم}$$

$$م ج = ١٢ \text{ سم}$$

$$\angle(ب) = ٩٠^\circ$$

(٤) من الشكل المقابل اكمل



$$\angle(ل) = \angle(م) \times \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(م) - \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(م) + \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(ه) \times \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(ه) - \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(ه) + \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(ه) \times \dots$$

$$\angle(ل) = \angle(ه) - \dots$$

(١٠) حدد نوع المثلث في الحالات الآتية

- (١) أ ج = ٥ ، ب ج = ٧ سم ، أ ب = ١٠ سم
 (٢) س ص = ٤ سم ، ص ع = ٦ سم ، س ع = ٥
 (٣) ل م = ٤ سم ، م ن = ٤ سم ، ل ن = ٩ سم


(١١) حدد نوع المثلث في الحالات الآتية

- (١) أ ب = ١٢ سم ، ب ج = ١٥ سم ، أ ج = ٩ سم
 (٢) أ ب = ٢٠ سم ، ب ج = ٢٥ سم ، أ ج = ١٢ سم
 (٣) أ ب = ٨ سم ، ب ج = ١٠ سم ، أ ج = ٧ سم
 (٤) أ ب = ٣ سم ، ب ج = ٥ سم ، أ ج = ٦ سم
 (٥) أ ب = ١٢ سم ، ب ج = ١٦ سم ، أ ج = ٢٠ سم

(١٢) أكمل لتحصل على عبارة صحيحة


- ١ في Δ أ ب ج إذا كان (أ ب) $<$ (أ ج) + (ب ج) فإن ب ..
 ٢ في Δ أ ب ج إذا كان (أ ب) = (أ ج) + (ب ج) فإن ب
 ٣ في Δ أ ب ج إذا كان (أ ب) $>$ (أ ج) + (ب ج) فإن ب
 ٤ إذا كان المثلث حاد الزوايا فإن مساحة المربع المنشأ على أى ضلع من أضلاعه من مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين
 ٥ إذا كان المثلث منفرج الزاوية فإن مساحة المربع المنشأ الضلع المقابل للزاوية المنفرجة من مجموع مساحتي المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين
 ٦ المثلث الذى أطوال أضلاعه ٣ سم ، ٤ سم ، ٥ سم يكون

(٥) في الشكل المقابل :




- أوجد طول
 س هـ ، س ب ، س م

(٦) في الشكل المقابل




- (١) أوجد طول كل من
 س ب ، س م
 (٢) أوجد طول مسقط
 س ب على س هـ

(٧) في الشكل المقابل :



- أوجد طول كلا من
 س هـ ، س م

(٨) في الشكل المقابل



- أوجد طول
 س هـ ، س ب ، س م

(٩) حدد نوع الزاوية التى لها أكبر قياس

في Δ أ ب ج حيث

- أ ب = ٨ سم ، ب ج = ١١ سم ، أ ج = ٧ سم